小児　造血器腫瘍　院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2011.12.6	11192	Vinblastine(6) 悪性リンパ腫	エクザール注射用	6 mg/㎡ (max 10 mg)	点滴静注 day 1	7日	悪性リンパ腫	済
2012.10.2	12212	(医)【AML-05】 寛解導入療法1:ECM	エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	28日	急性骨髄性白血病	済
			キロサイド注	200 mg/㎡	点滴静注 day 6-12			
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 6-10			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12mg	髄注 day 6			
			キロサイド注	6 mg-30mg	髄注 day 6			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25mg	髄注 day 6			
		(医)【AML-05】 寛解導入療法2:HCEI	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-3	28日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			イダマイシン静注用	10 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 低リスク群 強化療法1:HCE	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-5	28日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 低リスク群 強化療法2:HCI	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-3	28日		
			イダマイシン静注用	10 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 低リスク群 強化療法3:HC	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-5	28日		
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 中間リスク群 強化療法1及び3:HCM	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-5	28日		
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 中間リスク群 強化療法2:HCEI	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-3	28日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			イダマイシン静注用	10 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 中間リスク群 強化療法3:HC	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-5	28日		
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
		(医)【AML-05】 高リスク群 強化療法1:HCM	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡/回 ×1日2回	点滴静注 day 1-5	28日		
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	3 mg-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6 mg-30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	10 mg-25 mg	髄注 day 1			
2013.4.2	13228	(医)【ALL SR-02】 VCR(1.5)+MTX+6-MP+PSL 維持療法 (3歳以上)	オンコビン注射用	1.3 mg/㎡	静脈内注射 day 1	7日	急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病	済
			メソトレキセート錠	25 mg/㎡	経口投与 day 1			
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-7			
			プレドニン錠	40 mg/㎡	経口投与 day 1-7			
		(医)【ALL SR-02】 MTX+Ara-C+HDC+MTX+6-MP 維持療法 (3歳以上)	注射用メソトレキセート	12 mg	髄注 day 1	7日		
			キロサイド注	30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	25 mg	髄注 day 1			
			メソトレキセート錠	25 mg/㎡	経口投与 day 1			
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-7			
		(医)【ALL SR-02】 MTX+6-MP内服 維持療法	メソトレキセート錠	25 mg/㎡	経口投与 day 1	7日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-7			
		【ALL-B12】先行治療相	プレドニン錠/水溶性プレドニン	15-60 mg/㎡	経口or静注 day 1-7	7日		
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 1			
		【ALL-B12】寛解導入療法	プレドニン錠/水溶性プレドニン	7.5-60 mg/㎡	経口or静注 day 1-29	29日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 1, 8, 15, 22			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8			
			ロイナーゼ注用	5000 U/㎡	筋肉内注射or点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
		【ALL-B12】早期強化療法IB	注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日		
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 10, 24			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 10, 24			
		【ALL-B12】早期強化療法IB+L	注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日		
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 10, 24			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 10, 24			
			ロイナーゼ注用	5000 U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27			
		【ALL-B12】早期強化療法IB+VL	注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日		
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 10, 24			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 10, 24			
			ロイナーゼ注用	5000 U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 15, 22			
		【ALL-B12】強化療法M2	メソトレキセート点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 8	14日		
			ロイケリン散	25 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 8			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 8			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2013.6.4	13234	【ALL-B12】強化療法M5	メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 8	14日	B前駆細胞性急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病	–
			ロイケリン散	25 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 8			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 8			
		【ALL-B12】強化療法M5+L	メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 8	14日		
			ロイケリン散	25 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 8			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 8			
			ロイナーゼ注用	12500 U/㎡	筋肉内注射 day 10			
		【ALL-B12】強化療法M5+VL	メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 8	14日		
			ロイケリン散	25 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 8			
			ロイナーゼ注用	12500 U/㎡	筋肉内注射 day 10			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 8			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 8			
		【ALL-B12】強化療法HR3	デカドロン錠 デキサート注	20 mg/㎡	経口or静注 day 1-5	21日		
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 1-2			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 3-5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 5			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 5			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 5			
		【ALL-B12】強化療法HR2	デカドロン錠 デキサート注	20 mg/㎡	経口or静注 day 1-5	21日		
			注射用フィルデシン	3 mg/㎡ (max 5.0 mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			イホマイド注	800 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 1 (day 5)			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 1 (day 5)			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 1 (day 5)			
		【ALL-B12】強化療法HR1	デカドロン錠 デキサート注	20 mg/㎡	経口or静注 day 1-5	21日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			注射用エンドキサン	200 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 1			
		【ALL-B12】再寛解導入療法III	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静注 day 1, 8	35日		
			デカドロン錠 デキサート注	1.25-10 mg/㎡	経口（or静注） day 1-23			
			デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡	経口（or静注） day 1-7, 15-21			
			テラルビシン注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8			
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11			
			注射用エンドキサン	500 mg/㎡	点滴静注 day 15			
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 15-28			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
		【ALL-B12】再寛解導入療法III+L	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静注 day 1, 8	35日		
			デカドロン錠 デキサート注	1.25-10 mg/㎡	経口（or静注） day 1-23			
			デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡	経口（or静注） day 1-7, 15-21			
			テラルビシン注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8			
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25			
			注射用エンドキサン	500 mg/㎡	点滴静注 day 15			
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 15-28			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
		【ALL-B12】再寛解導入療法III+VL	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1, 8, 15, 22	35日		
			デカドロン錠 デキサート注	1.25-10 mg/㎡	経口（or静注） day 1-23			
			デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡	経口（or静注） day 1-7, 15-21			
			テラルビシン注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8			
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25			
			注射用エンドキサン	500 mg/㎡	点滴静注 day 15			
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 15-28			
			注射用メソトレキセート	8-12 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			キロサイド注	20-30 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
			水溶性プレドニン	6-10 mg	髄注 day 17, 24 (day 1)			
		【ALL-B12】中間維持療法IM	ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-7	7日		
			メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1			
		【ALL-B12】中間維持療法IM+VD	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22	28日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1			
			デカドロン錠 デキサート注	6 mg/㎡	経口or静注 day 1-5			
		【ALL-B12】維持療法	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1	7日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-7			
		【ALL-B12】維持療法+VD	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22	28日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1			
			デカドロン錠 デキサート注	6 mg/㎡	経口or静注 day 1-5			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2013.6.4	13235	(医)【ALL-T11】先行治療相	プレドニン錠/水溶性プレドニン	15-60 mg/㎡	経口or静注 day 1-7	7日	T細胞性 急性ﾘﾝﾊﾟ性白血病	–
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
		(医)【ALL-T11】寛解導入療法IA	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1, 8, 15, 22	35日		
			デカドロン錠	1.25-10 mg/㎡	経口投与 day 1-30			
			デカドロン錠	1.25-10 mg/㎡	経口投与 day 1-7, 15-30			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15, 22			
			ロイナーゼ注用	5000 U/㎡	筋肉内注射or点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 5, 26 (day 11, 20)			
		(医)【ALL-T11】早期強化療法IB	注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日		
			ロイナーゼ注用	5000 U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27			
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 10, 24			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 10, 24			
		(医)【ALL-T11】SRの強化療法M+L	メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 8, 22, 36, 50	70日		
			ロイナーゼ注用	12500 U/㎡	筋肉内注射 day 10, 24, 38, 52			
			ロイケリン散	25 mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 8, 22, 36, 50			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 8, 22, 36, 50			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 8, 22, 36, 50			
		(医)【ALL-T11】SRの再寛解導入療法IIA+L	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静注 day 8, 15, 22, 29	35日		
			デカドロン錠	1.25-10 mg/㎡	経口投与 day 1-30			
			デカドロン錠	1.25-10 mg/㎡	経口投与 day 1-7, 15-30			
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 8, 15, 22, 29			
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 8, 11, 15, 18			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 (day 1, 18)			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 (day 1, 18)			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 (day 1, 18)			
		(医)【ALL-T11】SRの再寛解導入療法IIB+L	注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1	28日		
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13			
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 3, 10			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 3, 10			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 3, 10			
		(医)【ALL-T11】SRの維持療法	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1			
		(医)【ALL-T11】HRの強化療法NEL	アラノンシー静注用	650 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	7日		
		(医)【ALL-T11】HRの強化療法HR3	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 3-5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 5			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 5			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 5			
		(医)【ALL-T11】HRの強化療法HR2	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			注射用フィルデシン	3 mg/㎡ (max 5.0 mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			イホマイド注	800 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1 (day 5)			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1 (day 5)			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1 (day 5)			
		(医)【ALL-T11】HRの強化療法HR1	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用エンドキサン	200 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1			
		(医)【ALL-T11】HRの再寛解導入療法IIA+L	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 8, 15, 22, 29	35日		
			デカドロン錠	1.25-10 mg/㎡	経口投与 day 1-30			
			デカドロン錠	1.25-10 mg/㎡	経口投与 day 1-7, 15-30			
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 8, 15, 22, 29			
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 8, 11, 15, 18			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 (day 1, 18)			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 (day 1, 18)			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 (day 1, 18)			
		(医)【ALL-T11】HRの再寛解導入療法IIB+L	注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1	35日		
			ロイナーゼ注用	10000 U/㎡	筋肉内注射 day 1, 4, 8, 11			
			キロサイド注	75 mg/㎡	静脈内注射 day 3-6, 10-13			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 3, 10			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 3, 10			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 3, 10			
		(医)【ALL-T11] HRの維持療法CNS3以外の場合①	アラノンシー静注用	650 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	56日		
			メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50			
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 8-56			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 29			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 29			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 29			
		(医)【ALL-T11] HRの維持療法CNS3以外の場合②	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 29			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 29			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 29			
		(医)【ALL-T11] HRの維持療法CNS3の場合サイクル1	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-56			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
		(医)【ALL-T11】 HRの維持療法CNS3の場合サイクル2以降①	アラノンジー静注用	650 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	56日		
			メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50			
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 8-56			
		(医)【ALL-T11】 HRの維持療法CNS3の場合サイクル2以降②	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡	経口投与 day 1-56			
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療NEL	アラノンジー静注用	650 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	7日		
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療HR3	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 3-5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 5			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 5			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 5			
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療HR2	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			注射用フィルデシン	3 mg/㎡ (max 5.0 mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			イホマイド注	800 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1 (day 5)			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1 (day 5)			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1 (day 5)			
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療HR1	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1, 6			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用エンドキサン	200 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 6, 11			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1			
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療Con.C	デキサート注	82.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 3, 5	21日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			キロサイド注	300 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1			
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療Con.A	プレドニン錠/水溶性プレドニン	40 mg/㎡	経口or静注 day 1-7	21日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1			
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			キロサイド注	300 mg/㎡	点滴静注 day 2-6			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 3, 8			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1			
		(医)【ALL-T11】VHRの寛解後治療Con.B	プレドニン錠/水溶性プレドニン	40 mg/㎡	経口or静注 day 1-7	21日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2.0 mg)	静脈内注射 day 1, 8			
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			テラルビシン注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 2, 3			
			ロイナーゼ注用	25000 U/㎡	筋肉内注射 day 3, 10, 17			
			注射用メソトレキセート	6-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	16-30 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	4-10 mg	髄注 day 1			
		(医)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コースP	水溶性プレドニン	10 mg/㎡	点滴静注 day 1-3	7日		済
			水溶性プレドニン	20 mg/㎡	点滴静注 day 4-7			
			オンコビン注射用	1 mg/㎡	静脈内注射 day 3			
			注射用エンドキサン	150 mg/㎡	点滴静注 day4-6			
			注射用メソトレキセート	3ヶ月未満：3 mg、 1歳未満：6 mg、 1歳：8 mg、2歳：10 mg、 3歳以上：12 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満：10 mg、 1歳未満：10 mg、 1歳：15 mg、2歳：20 mg、 3歳以上：25 mg	髄注 day 1			
		(医)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース4A1	デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡ （8.25 mg/㎡）	経口投与 day 1-8 （経口不可の場合点滴静注 day1-8）	21日		済
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 2			
			注射用エンドキサン	250 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 3, 4			
			注射用メソトレキセート	3ヶ月未満：3 mg、 1歳未満：6 mg、 1歳：8 mg、2歳：10 mg、 3歳以上：12 mg	髄注 day 1, 8			
			キロサイド注	3ヶ月未満：6 mg、 1歳未満：15 mg、 1歳：20 mg、2歳：25 mg、 3歳以上：30 mg	髄注 day 1, 8			
			ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満：10 mg、 1歳未満：10 mg、 1歳：15 mg、2歳：20 mg、 3歳以上：25 mg	髄注 day 1, 8			
		(医)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース4A2	デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡ （8.25 mg/㎡）	経口投与 day 1-8 （経口不可の場合点滴静注 day1-8）	21日		済
			メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 2			
			注射用エンドキサン	1000 mg/㎡	点滴静注 day 4, 5			
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 4, 5			
			注射用メソトレキセート	3ヶ月未満：3 mg、 1歳未満：6 mg、 1歳：8 mg、2歳：10 mg、 3歳以上：12 mg	髄注 day 1, 8			
			キロサイド注	3ヶ月未満：6 mg、 1歳未満：15 mg、 1歳：20 mg、2歳：25 mg、 3歳以上：30 mg	髄注 day 1, 8			
			ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満：10 mg、 1歳未満：10 mg、 1歳：15 mg、2歳：20 mg、 3歳以上：25 mg	髄注 day 1, 8			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2013.12.3	13256	(医)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース4B	デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡ （8.25 mg/㎡）	経口投与 day 1-8 （経口不可の場合点滴静注 day1-8）	21日	成熟B細胞性腫瘍	済
			シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 2-5			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 1			
			注射用メソトレキセート	3ヶ月未満：3 mg、 1歳未満：6 mg、 1歳：8 mg、2歳：10 mg、 3歳以上：12 mg	髄注 day 1, 8			
			キロサイド注	3ヶ月未満：6 mg、 1歳未満：15 mg、 1歳：20 mg、2歳：25 mg、 3歳以上：30 mg	髄注 day 8			
			ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満：10 mg、 1歳未満：10 mg、 1歳：15 mg、2歳：20 mg、 3歳以上：25 mg	髄注 day 1, 8			
		(医)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース3A	デカドロン錠 デキサート注	10 mg/㎡ （8.25 mg/㎡）	経口投与 day 1-7 （経口不可の場合点滴静注 day1-7）	21日		済
			メソトレキセート点滴静注液	3000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 2			
			注射用エンドキサン	250 mg/㎡	点滴静注 day 2-4			
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 4, 5			
			注射用メソトレキセート	3ヶ月未満：3 mg、 1歳未満：6 mg、 1歳：8 mg、2歳：10 mg、 3歳以上：12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	3ヶ月未満：6 mg、 1歳未満：15 mg、 1歳：20 mg、2歳：25 mg、 3歳以上：30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満：10 mg、 1歳未満：10 mg、 1歳：15 mg、2歳：20 mg、 3歳以上：25 mg	髄注 day 1			
		(医)【B-NHL03】小児B細胞性腫瘍 コース3B	注射用メソトレキセート メソトレキセート点滴静注液	500 mg/㎡	点滴静注 day 1	21日		済
			キロサイド注	150 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 3-5			
			注射用メソトレキセート	3ヶ月未満：3 mg、 1歳未満：6 mg、 1歳：8 mg、2歳：10 mg、 3歳以上：12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	3ヶ月未満：6 mg、 1歳未満：15 mg、 1歳：20 mg、2歳：25 mg、 3歳以上：30 mg	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注射用	3ヶ月未満：10 mg、 1歳未満：10 mg、 1歳：15 mg、2歳：20 mg、 3歳以上：25 mg	髄注 day 1			
2014.6.30	14274	(医)【ALB-NHL03】後期維持相	プレドニン錠	40 mg/㎡ (max 60 mg)	経口投与 day 43-47	56日	リンパ芽球型 リンパ腫	済
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡ (max 2 mg)	静脈内注射 day 43, 50			
			ロイナーゼ注用	6000 U/㎡	点滴静注 day 43, 50			
			注射用メソトレキセート メソトレキセート点滴静注液	150 mg/㎡	静脈内注射 day 1, 15, 29			
			ロイケリン散	60 mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
2014.6.30	14275	(医)【AML-12】寛解導入1A:ECM	エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	28日	急性骨髄性白血病	済
			キロサイド注	200 mg/㎡	点滴静注 day 6-12			
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 6-10			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】寛解導入1B:HD-ECM	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1, 3, 5	28日		
			エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 2-6			
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 2-6			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【ALM-12】寛解導入2:HECI	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-3	28日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			イダマイシン静注用	10 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】CBF SR群強化療法1:sECM	エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 1-3	28日		
			キロサイド注	200 mg/㎡	点滴静注 day 4-8			
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 4-6			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】CBF SR群強化療法2:HCE	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-5	28日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】CBF SR群強化療法3:HCI	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-3	28日		
			イダマイシン静注用	10 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】CBF SR群強化療法4:HC	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-5	28日		
		(医)【ALM-12】 Non-CBF SR群・HR群強化療法1:HCM	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-5	28日		
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】 Non-CBF SR群・HR群強化療法2:HCEI	シタラビン点滴静注液	3000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-3	28日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			イダマイシン静注用	10 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				
		(医)【AML-12】 Non-CBF SR群・HR群強化療法3:HCM	シタラビン点滴静注液	2000 mg/㎡×2	点滴静注 day 1-5	28日		
			ノバントロン注	5 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	3-12 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	6-30 mg				
			ソル・コーテフ注射用	10-25 mg				

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2016.3.25	15323	(医)[LCH-12]Ara-C+VCR+PSL (寛解導入相A)	キロサイド注	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5, 15-19, 29-33	42日	ﾗﾝｹﾞﾙﾊﾝｽ細胞組織球症	済
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈注射 day 1, 15, 29			
			プレドニン錠	40 mg/㎡ 20 mg/㎡ 10 mg/㎡	経口投与 day 1-28 経口投与 day 29-35 経口投与 day 36-42			
		(医)[LCH-12]Ara-C+VCR+PSL (早期維持相A)治療区分a	キロサイド注	150 mg/㎡	点滴静注 day 1	14日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈注射 day 1			
			プレドニン錠	40 mg/㎡	経口投与 day 1-4			
		(医)[LCH-12]MTX+VCR+PSL (早期維持相A)治療区分b	注射用メソトレキセート	20 mg/㎡	静脈注射 day 1	14日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈注射 day 1			
			プレドニン錠	40 mg/㎡	経口投与 day 1-3			
		(医)[LCH-12]VBL+PSL+6-MP (後期維持相C)治療区分a	エクザール注	6 mg/㎡	静脈注射 day 1	14日		
			プレドニン錠	40 mg/㎡	経口投与 day 1-5			
			ロイケリン散	30 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
		(医)[LCH-12]MTX+VCR+PSL (早期維持相A)治療区分b	メソトレキセート錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1	14日		
			ロイケリン散	30 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
2017.6.6	17361	(医)[ALB-NHL-14] 先行治療相	水溶性プレドニン　または プレドニン錠	day 1: 15 mg/㎡ day 2: 30 mg/㎡ 可能ならday 3から60 mg/㎡ （遅くともday 5までに 60mg/㎡とする）	day 3までは静注分3投与 day 4からは経口分3投与又は静注	7日	リンパ芽球性リンパ腫	済
			注射用メソトレキセート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、 2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	髄注 day 1			
		(医)[ALB-NHL-14]寛解導入相	水溶性プレドニン　または プレドニン錠	60 mg/㎡（最大80 mg）	経口分3投与又は静注 day 1-30 （day 22-30で3段階漸減中止）	30日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（最大2 mg）	静注 day 1, 8, 15, 22			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡（最大60 mg）	点滴静注 day 1, 8, 15, 22			
			ロイナーゼ注用	5,000 U/㎡（上限なし）	筋注または点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26			
			注射用メソトレキセート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、 2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	髄注 day 5, 26 （CNS陽性例はday 11,20に追加投与）			
			キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、 2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、 2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg				
		(医)[ALB-NHL-14]早期強化相	注射用エンドキサン	1,000 mg/㎡（上限なし）	点滴静注 day 1, 29	42日		
			キロサイド注	75 mg/㎡（上限なし）	点滴静注 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイケリン散	60 mg/㎡（上限なし）	経口分1 就寝前投与 day 1-28			
			注射用メソトレキセート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、 2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、 2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、 2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg				
		(医)[ALB-NHL-14]CNS予防相	メソトレキセート点滴静注液	5.0 g/㎡（上限なし）	点滴静注 day 8, 22, 36, 50 投与量の10%を最初の30分で、 残りの90%を23時間30分で	28日		
			ロイコボリン注	15 mg/㎡（上限なし）	MTX 開始42, 48, 54時間目に静注			
			ロイケリン散	60 mg/㎡（上限なし）	経口分1 就寝前投与 day 1-56			
			注射用メソトレキセート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、 2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	髄注 day 8, 22, 36, 50			
			キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、 2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、 2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg				
		(医)[ALB-NHL-14]再寛解導入相	デカドロン錠　または デキサート注射液	10 mg/㎡（最大13 mg） （8.25 mg/㎡（最大10.7 mg））	経口分3 投与又は静注 day 1-21 （day 22-30で3段階漸減中止）	35日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（最大2 mg）	静注 day 8, 15, 22, 29			
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡（最大60 mg）	点滴静注 day 8, 15, 22, 29			
			ロイナーゼ注用	10,000 U/㎡（上限なし）	筋注または点滴静注 day 8, 11, 15, 18			
		(医)[ALB-NHL-14]後期強化相	注射用エンドキサン	1,000 mg/㎡（上限なし）	点滴静注 day 1	28日		
			キロサイド注	75 mg/㎡（上限なし）	点滴静注 day 3-6, 10-13			
			ロイケリン散	60 mg/㎡（上限なし）	経口分1 就寝前投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	1歳未満: 6 mg、1歳: 8 mg、 2歳: 10 mg、3歳以上: 12 mg	髄注 day 3, 10 （CNS陽性例はday 3のみ）			
			キロサイド注	1歳未満: 16 mg、1歳: 20 mg、 2歳: 26 mg、3歳以上: 30 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満: 4 mg、1歳: 6 mg、 2歳: 8 mg、3歳以上: 10 mg				
		(医)[ALB-NHL-14]維持相	メソトレキセート錠	20 mg/㎡（上限なし）	経口分1朝 day 1	7日		
			ロイケリン散	50 mg/㎡（上限なし）	経口分1 就寝前投与 day 1-7			
2019.9.26	19429	Nivolumab(240) 再発難治古典的ホジキンリンパ腫	オプジーボ点滴静注	240 mg/body	点滴静注 day 1	14日	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	済
2020.4.6	20452	(研)[AML-D16] 寛解導入療法(初回)	テラルビシン注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2	7日	急性骨髄性白血病	済
			エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 3-5			
			キロサイド注	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-7			
2020.5.14		(研)[MLL-17] MLL-gALL 早期強化療法G	エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-4	21日		
			キロサイド注	500 mg/㎡	点滴静注 day 1-4			
			注射用メソトレキセート	1歳未満 : 6 mg 1歳 : 8 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	1歳未満 : 15 mg 1歳 : 20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満 : 6 mg 1歳 : 8 mg				
2020.6.2		(研)[MLL-17] PSL単独先行投与	水溶性プレドニン	60 mg/㎡	静脈内注射 day 1-7	7日		
			注射用メソトレキセート	1歳未満 : 6 mg 1歳以上 : 8 mg	髄注 day 1			
			水溶性プレドニン	1歳未満 : 6 mg 1歳以上 : 8 mg				
		(研)[MLL-17] MLL-gALL 強化療法G-I(Wk9, 11, 13)	メソトレキセート点滴静注液	3000 mg/㎡	点滴静注 day 1	14日		
			注射用エンドキサン	500 mg/㎡	点滴静注 day 3			
			ロイナーゼ注用	10000 IU/㎡	髄注 day 1			
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	1歳未満 : 6 mg 1歳以上 : 8 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	1歳未満 : 15 mg 1歳以上 : 20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満 : 6 mg 1歳以上 : 8 mg				

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2020.6.16	20454	(研)[MLL-17] MLL-gALL 強化療法G-II	オンコビン注射用	0.05 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	急性リンパ性白血病	済
			ダウノマイシン静注用	25 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15			
			キロサイド注	60 mg/㎡	点滴静注 day 2-7, 9-14			
			ロイケリン散	75 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg	髄注 day 1, 15			
			キロサイド注	1歳未満：15 mg 1歳以上：20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg				
		(研)[MLL-17] MLL-gALL 再寛解導入療法G(Wk19-)	オンコビン注射用	0.05 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日		
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 2			
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 3, 5			
			ロイナーゼ注用	10000 IU/㎡	点滴静注 day 15, 17, 19, 22, 24, 26			
			デカドロン錠	10 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 15-28			
			注射用メソトレキセート	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg	髄注 day 1, 15			
			キロサイド注	1歳未満：15 mg 1歳以上：20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg				
		(研)[MLL-17] MLL-gALL 再寛解導入療法G(Wk23-)	エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-4	21日		
			キロサイド注	500 mg/㎡	点滴静注 day 1-4			
			プレドニン錠	漸減中止	経口投与 day 1-7			
			注射用メソトレキセート	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	1歳未満：15 mg 1歳以上：20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg				
2020.8.4		(研)[MLL-17] MLL-gALL 寛解導入療法G(Wk2-)	オンコビン注射用	0.05 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日		
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 2			
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 3, 5			
			ロイナーゼ注用	10000 IU/㎡	点滴静注 day 15, 17, 19, 22, 24, 26			
			デカドロン錠	10 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 15-28			
			注射用メソトレキセート	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg	髄注 day 1, 15 (CNS陽性例は day 8, 22 に追加投与)			
			キロサイド注	1歳未満：15 mg 1歳以上：20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg				
2020.9.10		(研)[MLL-17] MLL-gALL 維持療法G-I(Wk26, 30, 40, 44-)	エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 14	28日		
			キロサイド注	200 mg/㎡	点滴静注 day 14			
			メソトレキセート錠	30 mg/㎡	経口投与 day 1, 8			
			ロイケリン散	75 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			注射用メソトレキセート	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	1歳未満：15 mg 1歳以上：20 mg				
			水溶性プレドニン	1歳未満：6 mg 1歳以上：8 mg				
		(研)[MLL-17] MLL-gALL 維持療法G-I(Wk34, 48-)	メソトレキセート錠	30 mg/㎡	経口投与 day 1, 8	14日		
			ロイケリン散	75 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
		(研)[MLL-17] MLL-gALL 維持療法G-I(Wk36, 50-)	メソトレキセート点滴静注液	300 mg/㎡	点滴静注 day 1	28日		
			オンコビン注	0.05 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15			
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 1-14			
2020.9.10	20466	(研)[HL-14] ホジキンリンパ腫（OPPA/女児）	オンコビン注	10kg以上：1.5 mg/㎡ 10kg未満：0.05 mg/kg (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	ホジキンリンパ腫	済
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	40 mg/㎡	点滴静注 day 1, 15			
			塩酸プロカルバジンカプセル	100 mg/㎡	経口投与 day 1-15			
			プレドニン錠	60 mg/㎡ (max 80 mg/body)	経口投与 day 1-15 (day 16-22 tapered)			
		(研)[HL-14] ホジキンリンパ腫（COPP/女児）	エンドキサン注	500 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8	28日		
			オンコビン注	10kg以上：1.5 mg/㎡ 10kg未満：0.05 mg/kg (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 8			
			塩酸プロカルバジンカプセル	100mg/㎡	経口投与 day 1-15			
			プレドニン錠	60 mg/㎡ (max 80 mg/body)	経口投与 day 1-15 (day 16-22 tapered)			
2023.2.7		(研)[HL-14] ホジキンリンパ腫（OEPA/男児）	オンコビン注	10kg以上：1.5 mg/㎡ 10kg未満：0.05 mg/kg (max 2 mg/body)	静注 day 1, 8, 15	28日	ホジキンリンパ腫	済
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	40 mg/㎡	点滴静注 day 1, 15			
			エトポシド点滴静注液	125 mg/㎡	点滴静注 day 2-6			
			プレドニン錠	60 mg/㎡ (max 80 mg/body)	経口投与 day 1-15 (day 16-22 tapered)			
		(研)[HL-14] ホジキンリンパ腫（COPDAC/男児）	エンドキサン注	500 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8	28日		
			オンコビン注	10kg以上：1.5 mg/㎡ 10kg未満：0.05 mg/kg (max 2 mg/body)	静注 day 1, 8			
			ダカルバジン注用	250mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			プレドニン錠	60 mg/㎡ (max 60 mg/body)	経口投与 day 1-15 (day 16-22 tapered)			
		(研)[LCH-19 多臓器型]ランゲルハンス細胞組織球症（初期治療相A）	キロサイド注	3.3 mg/kg (＜10kg) 100 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1-5, 15-19, 29-33	42日		
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg(＜10kg) 1.5 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1, 15, 29			
			デカドロン錠	0.2 mg/kg(＜10kg) 6 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-14			
			プレドニン錠	1.33 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 15-28			
				0.66 mg/kg(＜10kg) 20 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 29-35			
				0.33 mg/kg(＜10kg) 10 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 36-42			
			キロサイド注	年齢に応じた用量	髄注 day 1, 15			
			プレドニン錠	年齢に応じた用量				

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2022.7.22	22587	(研)[LCH-19 多臓器型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相Ia-it）	キロサイド注	3.3 mg/kg (＜10kg) 150 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1	14日	小児ランゲルハンス組織球症	済
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg(＜10kg) 1.5 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1			
			プレドニン錠	1.5 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-4			
			キロサイド注	年齢に応じた用量	髄注 day 1			
			プレドニン錠	年齢に応じた用量				
		(研)[LCH-19 多臓器型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相Ia）	キロサイド注	3.3 mg/kg (＜10kg) 150 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1	14日		
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg(＜10kg) 1.5 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1			
			プレドニン錠	1.5 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-4			
		(研)[LCH-19 多臓器型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相Ib）	メソトレキセート注	0.7 mg/kg(＜10kg) 20 mg/㎡(≧10kg)	静注 day 1	14日		
			プレドニン錠	1.5 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-3			
		(研)[LCH-19 多臓器型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相IIa）	エクザール注	0.2mg/kg(＜10kg) 6 mg/㎡ (≧10kg)	点滴静注 day 1	14日		
			プレドニン錠	1.5 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-5			
			ロイケリン散	1 mg/kg(＜10kg) 30 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-14			
		(研)[LCH-19 多臓器型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相IIb）	メソトレキセート錠	0.7 mg/kg(＜10kg) 20 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1	14日		
			ロイケリン散	1 mg/kg(＜10kg) 30 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-14			
2022.8.2		(研)[LCH-19 多発骨型]ランゲルハンス細胞組織球症（初期治療相A）	キロサイド注	3.3 mg/kg (＜10kg) 100 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1-5, 15-19, 29-33	42日		
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg(＜10kg) 1.5 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1, 15, 29			
			プレドニン錠	1.33 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg) 0.66 mg/kg(＜10kg) 20 mg/㎡(≧10kg) 0.33 mg/kg(＜10kg) 10 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-28 経口投与 day 29-35 経口投与 day 36-42			
		(研)[LCH-19 多発骨型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相Ia）	キロサイド注	3.3 mg/kg (＜10kg) 150 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1	14日		
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg(＜10kg) 1.5 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1			
			プレドニン錠	1.5 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-4			
		(研)[LCH-19 多発骨型]ランゲルハンス細胞組織球症（維持相Ib）	メソトレキセート注	0.7 mg/kg(＜10kg) 20 mg/㎡(≧10kg)	静注 day 1	14日		
			ゾレドロン酸点滴静注	0.13 mg/kg(＜10kg) 4.0 mg/㎡(≧10kg)	点滴静注 day 1			
			プレドニン錠	1.5 mg/kg(＜10kg) 40 mg/㎡(≧10kg)	経口投与 day 1-3			
2023.1.20	22606	(医)[ALL-R08]VCR+MTX+L-ASP+DEX+TIT 寛解導入療法F1	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 6	14日	急性リンパ性白血病	済
			メソトレキセート注	100 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	900 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			ロイナーゼ注	10000 U/㎡	点滴静注 day 4			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 1, 6			
			キロサイド注	年齢に応じた用量				
			水溶性プレドニン注	年齢に応じた用量				
			デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5			
		(医)[ALL-R08]VCR+Ara-C+L-ASP+DEX+TIT 寛解導入療法F2	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1	14日		
			シタラビン点滴静注	3 g/㎡×2回	点滴静注 day 1, 2			
			ロイナーゼ注	10000 U/㎡	点滴静注 day 4			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 5			
			キロサイド注	年齢に応じた用量				
			水溶性プレドニン注	年齢に応じた用量				
			デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5			
		(医)[ALL-R08] VDS+MTX+IFM+DBR+L-ASP+6-MP +DEX+TIT 強化療法R2	フィルデシン注	3 mg/㎡	点滴静注 day 1	(14日) 21日		
			メソトレキセート注	100 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	900 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			イホマイド注	400 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			ダウノマイシン注	35 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注	10000 U/㎡	点滴静注 day 6			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 1, 5			
			キロサイド注	年齢に応じた用量				
			水溶性プレドニン注	年齢に応じた用量				
			ロイケリン散	100 mg/㎡	経口投与 day 1-5			
			デカドロン錠	20 mg/㎡ 10 mg/㎡	経口投与 day 1-5 経口投与 day 6			
		(医)[ALL-R08]VCR+MTX+Ara-C+L-ASP+6-MP+DEX+TIT 強化療法R1	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (max 2mg/body)	点滴静注 day 1, 6	21日		
			メソトレキセート注	100 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	900 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			シタラビン点滴静注	2 g/㎡×2回	点滴静注 day 5			
			ロイナーゼ注	10000 U/㎡	点滴静注 day 6			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 1			
			キロサイド注	年齢に応じた用量				
			水溶性プレドニン注	年齢に応じた用量				
			ロイケリン散	100 mg/㎡	経口投与 day 1-5			
			デカドロン錠	20 mg/㎡ 10 mg/㎡	経口投与 day 1-5 経口投与 day 6			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2023.2.7	22609	(研)[B-NHL-20]R-COM1P B細胞性リンパ腫(低リスク)	オンコビン注	2 mg/㎡ (max 2 mg/body)	静注 day 1	15日	B細胞性リンパ腫	済
			メソトレキセート注	1000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	250 mg/㎡×2回	点滴静注 day 2-4			
			リツキシマブBS点滴静注	375 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注	年齢に応じた用量				
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 1-5 (day 6-8 tapered)			
		(研)[B-NHL-20]COP B細胞性リンパ腫(中間リスク)	オンコビン注	1 mg/㎡ (max 2 mg/body)	静注 day 1	7日		
			エンドキサン注	300 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注	年齢に応じた用量				
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 1-7			
		(研)[B-NHL-20]R-COM3P B細胞性リンパ腫(中間リスク)	オンコビン注	2 mg/㎡ (max 2 mg/body)	静注 day 1	15日		
			メソトレキセート注	3000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	250 mg/㎡×2回	点滴静注 day 2-4			
			リツキシマブBS点滴静注	375 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 1			
			ソル・コーテフ注	年齢に応じた用量				
			プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 1-5 (day 6-8 tapered)			
		(研)[B-NHL-20]R-CYM B細胞性リンパ腫(中間リスク)	メソトレキセート注	500 mg/㎡	点滴静注 day 1	15日		
			キロサイド注	150 mg/㎡	点滴静注 day 2-6			
			リツキシマブBS点滴静注	375 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			メソトレキセート注	年齢に応じた用量	髄注 day 2			
			ソル・コーテフ注	年齢に応じた用量				
2023.3.13	22610	(研)[ALL-B19]PSL+MTX-IT 先行治療相(IP)	プレドニン錠	15 mg/㎡ 30 mg/㎡ 60 mg/㎡	経口投与 day 1 経口投与 day 2-3, (4) 経口投与 day (4), 5-7	7日	小児B前駆細胞性急性リンパ性白血病	済
			メソトレキセート注	1歳：8 mg 2歳：10 mg 3歳以上：12 mg	髄注 day 1			
		(研)[ALL-B19]寛解導入療法(IA2)(LR, SR) 1-39歳 (研)[ALL-B19]寛解導入療法(IA4)(IR, HR) 1-39歳	プレドニン錠	60 mg/㎡	経口投与 day 1-21(day22-30 tapered)	28日		
			オンコビン注	1.5 mg/㎡ (max 2 mg/body)	静注 day 1, 8, 15, 22			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8 (IA2) 点滴静注 day 1, 8 (IA4)			
			ロイナーゼ注	5000 U/㎡	点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26			
			メソトレキセート注	1歳：8 mg 2歳：10 mg 3歳以上：12 mg	髄注 day 5, (11), (20), 26			
			キロサイド注	1歳：20 mg 2歳：26 mg 3歳以上：30 mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6 mg 2歳：8 mg 3歳以上：10 mg				
2023.4.10		(研)[ALL-B19]早期強化療法(IB)(LR, SR, IR) 1-39歳 (研)[ALL-B19]早期強化療法(IB+L)(HR) 1-39歳	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日		
			キロサイド注	75mg/㎡	点滴静注 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイナーゼ注	5000U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 (IB+Lのみ)			
			ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
2023.6.1		(研)[ALL-B19]HD-MTX療法(M)(LR)	メソトレキセート注	3000mg/㎡	点滴静注 day 1, 8	14日		
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 1, 8			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-B19]HD-MTX療法(M2)(LR, SR)	メソトレキセート注	2000mg/㎡	点滴静注 day 8	(1-3ｺｰｽ) 14日 (4ｺｰｽ) 28日		
			ロイケリン散	25mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-B19]HD-MTX療法(M5)(IR)	メソトレキセート注	5000mg/㎡	点滴静注 day 8	(1-3ｺｰｽ) 14日 (4ｺｰｽ) 28日		
			ロイケリン散	25mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
			プレドニン錠	40mg/㎡ 10mg/㎡	経口投与 day 1-14 経口投与 day 15-17			
			オンコビン注	1.5mg/㎡(max 2mg/body)	静注 day 1, 8, 15			
			テラルビシン注射用	25 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8			
			ロイナーゼ注	6000U/㎡	筋注 day 1, 3, 5, 8, 10, 12			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
		(研)[ALL-B19]再寛解導入療法(R)(LR)	メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 1	28日		
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-B19]再寛解導入療法(IIA)(LR, SR, IR, HR) 1-39歳	デカドロン錠	10 mg/㎡	経口投与 day 1-21(day22-30 tapered) 10-39歳はday8-14休薬	35日		
			オンコビン注	1.5mg/㎡(max 2mg/body)	静注 day 8, 15, 22, 29			
			ドキソルビシン塩酸塩注	30 mg/㎡	点滴静注 day 8, 15, 22, 29			
			ロイナーゼ注	10000U/㎡	筋注 day 8, 11, 15, 18			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day (1), (18)			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-B19]再寛解導入療法(IIB)(LR, SR, IR, HR)	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1	28日		
			キロサイド注	75mg/㎡	点滴静注 day 3-6, 10-13			
			ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 3, 10			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
2023. 4.11		(研)[ALL-T19]PSL+MTX-IT 先行治療相(IP)	プレドニン錠	15mg/㎡ 30mg/㎡ 60mg/㎡	経口投与 day 1 経口投与 day 2-3, (4) 経口投与 day (4), 5-7	7日		
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 1			
2023. 4.12		(研)[ALL-T19]寛解導入療法(IA) 0-39歳	デカドロン錠	10 mg/㎡	経口投与 day 1-21(day22-30 tapered) 10-39歳はday8-14休薬	28日		
			オンコビン注	1.5 mg/㎡(max 2mg/body)	静注 day 1, 8, 15, 22			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15, 22			
			ロイナーゼ注	5000 U/㎡	点滴静注 day 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 5, (11), (20), 26			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
2023. 5.1		(研)[ALL-T19]早期強化療法(IB+L) 0-39歳	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1, 29	42日		
			キロサイド注	75mg/㎡	点滴静注 day 3-6, 10-13, 17-20, 24-27			
			ロイナーゼ注	5000U/㎡	筋肉内注射 day 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27			
			ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-28			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 10, 24			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]強化療法M+L(SR) 0-24歳	メソトレキセート注	5000mg/㎡	点滴静注 day 8	(1-3ｺｰｽ) 14日 (4ｺｰｽ) 28日		
			ロイナーゼ注	12500U/㎡	筋注 day 10			
			ロイケリン散	25mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 8			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2023.6.1	23621	(研)[ALL-T19]強化療法NEL(HR)	アラノンジー静注用	6500mg/㎡	点滴静注　day 1-5	21日	小児T細胞性急性リンパ性白血病	済
		(研)[ALL-T19]強化療法HR3(HR, VHR) 0-24歳	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			シタラビン注	2000mg/㎡×2	点滴静注 day 1, 2			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡×2 (day3のみ1回)	点滴静注 day 3-5			
			ロイナーゼ注	12500U/㎡	筋注 day 6, 11			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 5			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]強化療法HR2(HR, VHR) 0-24歳	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			フィルデシン注	3mg/㎡	点滴静注 day 1, 6			
			ダウノマイシン静注用	30 mg/㎡	点滴静注 day 5			
			メソトレキセート注	5000mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用イホマイド	800 mg/㎡×2 (day2のみ1回)	点滴静注 day 2-4			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 5			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]強化療法HR1(HR, VHR) 0-24歳	デカドロン錠	20 mg/㎡	経口投与 day 1-5	21日		
			オンコビン注	1.5mg/㎡ (max 2mg/body)	静注 day 1, 6			
			シタラビン注	2000mg/㎡×2	点滴静注 day 5			
			メソトレキセート注	5000mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用エンドキサン	200mg/㎡ ×2 (day2のみ1回)	点滴静注 day 2-4			
			ロイナーゼ注	25000U/㎡	筋注 day 6, 11			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 5			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
2023.8.1		(研)[ALL-T19]再寛解導入療法(IIA)(SR, HR) 0-39歳	デカドロン錠	10 mg/㎡	経口投与 day 1-21(day22-30 tapered) 10-39歳はday8-14休薬	35日		
			オンコビン注	1.5mg/㎡(max 2mg/body)	静注 day 8, 15, 22, 29			
			ドキソルビシン塩酸塩注	30 mg/㎡	点滴静注 day 8, 15, 22, 29			
			ロイナーゼ注	10000U/㎡	筋注 day 8, 11, 15, 18			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day (1), (18)			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]再寛解導入療法(IIB+L)(SR, HR) 0-39歳	注射用エンドキサン	1000mg/㎡	点滴静注 day 1	28日		
			ロイナーゼ注	10000U/㎡	筋注 day 1, 4, 8, 11			
			キロサイド注	75mg/㎡	点滴静注 day 3-6, 10-13			
			ロイケリン散	60mg/㎡	経口投与 day 1-14			
			メソトレキセート注	1歳未満：6mg 1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 3, 10			
			キロサイド注	1歳未満：16mg 1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳未満：4mg 1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]維持療法(SR) #1-#3	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			オンコビン注	1.5mg/㎡ (max 2.0mg/body)	静脈内注射 (day 1)			
			デカドロン錠	6mg/㎡	経口投与 (day 1-5)			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2024.1.4		(研)[ALL-T19]維持療法(SR) #4-#9	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日	小児T細胞性急性リンパ	済
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 1			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]維持療法(SR) #10	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 1, 8	56日		
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-14			
		(研)[ALL-T19]維持療法(HR) #1-#4	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 8-56			
			アラノンジー静注用	650mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 29			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]維持療法(HR) #5	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 29			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]維持療法(HR) #6-#7	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			オンコビン注	1.5mg/㎡ (max 2.0mg/body)	静脈内注射 (day 1)			
			デカドロン錠	6mg/㎡	経口投与 (day 1-5)			
			メソトレキセート注	1歳：8mg 2歳：10mg 3歳以上：12mg	髄注 day 29			
			キロサイド注	1歳：20mg 2歳：26mg 3歳以上：30mg				
			水溶性プレドニン注	1歳：6mg 2歳：8mg 3歳以上：10mg				
		(研)[ALL-T19]維持療法(HR) #8	メソトレキセート錠	20mg/㎡	経口投与 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日		
			ロイケリン散	50mg/㎡	経口投与 day 1-56			
			オンコビン注	1.5mg/㎡ (max 2.0mg/body)	静脈内注射 (day 1)			
			デカドロン錠	6mg/㎡	経口投与 (day 1-5)			
2023.4.13	23622	(研)[EBV-HLH-15]ETP(150) 血球貪食症候群	エトポシド点滴静注液	150mg/㎡	点滴静注 day 1, 4 (Week1, 2) 点滴静注 day 1 (Week3, 4)	7日	血球貪食症候群	済
		(研)[EBV-HLH-15]Rituximab(375) 血球貪食症候群	リツキシマブBS点滴静注	375mg/㎡	点滴静注 day 1 (Week6, 7)	7日		

小児　骨・軟部腫瘍　院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2011.10.4	11176	VAC導入 横紋筋肉腫	オンコビン注射用	0.025 mg/kg-1.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57	84日	横紋筋肉腫	済
			コスメゲン静注用	0.025 mg/kg-0.045 mg/kg	点滴静注 day 1, 22, 43, 64			
			注射用エンドキサン	36 mg/kg-2.2 g/㎡	点滴静注 day 1, 22, 43, 64			
		VAC局所 横紋筋肉腫	オンコビン注射用	0.025 mg/kg-1.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57	84日		
			コスメゲン静注用	0.025 mg/kg-0.045 mg/kg	点滴静注 day 1, 22, 43, 64 （放射線照射中は除く）			
			注射用エンドキサン	36 mg/kg-2.2 g/㎡	点滴静注 day 1, 22, 43, 64			
		VAC継続 横紋筋肉腫	オンコビン注射用	0.025 mg/kg-1.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 85, 92	126日		
			コスメゲン静注用	0.025 mg/kg-0.045 mg/kg	点滴静注 day 1, 22, 43, 64, 85, 92 （放射線照射中は除く）			
			注射用エンドキサン	36 mg/kg-2.2 g/㎡	点滴静注 day 1, 22, 43, 64, 85, 92			
2011.10.4	11177	VDC(VCR(1.5)+DXR(75)+CPA(1200)) /VDC-IE 骨･軟部肉腫	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8	14日	骨・軟部肉腫	済
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	75 mg/㎡	点滴静注 day 1 (48hr)			
			注射用エンドキサン	1.2 g/㎡	点滴静注 day 1			
2011.10.4	11178	IFM(1800)+ETP(100) /VDC-IE 骨･軟部肉腫	イホマイド注	1.8 g/㎡	点滴静注 day 1-5	21日	骨・軟部肉腫	済
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
2011.10.4	11179	[JCOG0905](≧20歳) HD-MTX(10000) 骨肉腫	メソトレキセート点滴静注液	10 g/㎡	点滴静注 day 1	7日	骨肉腫	済
		[JCOG0905](≦19歳) HD-MTX(12000) 骨肉腫	メソトレキセート点滴静注液	12 g/㎡	点滴静注 day 1	7日		
2011.10.4	11180	[JCOG0905](≦29歳) DXR(30)+CDDP(120) 骨肉腫	シスプラチン点滴静注	120 mg/㎡	点滴静注 day 1	21日	骨肉腫	済
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
		[JCOG0905](≧30歳) DXR(30)+CDDP(100) 骨肉腫	シスプラチン点滴静注	10 mg/㎡	点滴静注 day 1	21日		
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
		[JCOG0905]Doxorubicin(30) 骨肉腫	ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1-3	21日		
2011.10.4	11181	[JCOG0905]Ifosfamide(3000) 骨肉腫	イホマイド注	3000 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	21日	骨肉腫	済

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2019.8.6	19424	(研)[JRS-Ⅱ IR]VAC 横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上） Wk1-3	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (Max: 2.0 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上）	済
			コスメゲン注	0.045 mg/kg (Max: 2.5 mg/body)	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ IR]VI 横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上） Wk4- Wk7- Wk13- Wk16-	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (Max: 2.0 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15	21日		
			トポテシン点滴静注	50 mg/㎡ (Max: 100 mg/body)	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-Ⅱ IR]VAC 横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上） Wk10- Wk22- Wk25- Wk37-	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (Max: 2.0 mg/body)	点滴静注 day 1, 8	21日		
			コスメゲン注	0.045 mg/kg (Max: 2.5 mg/body)	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	2200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ IR]VC 横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上） W19-21	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (Max: 2.0 mg/body)	点滴静注 day 1, 8	21日		
			エンドキサン注	2200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ IR]VAC療法 横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上） Wk28- Wk34- Wk40-	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (Max: 2.0 mg/body)	点滴静注 day 1	21日		
			コスメゲン注	0.045 mg/kg (Max: 2.5 mg/body)	点滴静注 day 1			
			エンドキサン注	2200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		（研） [JRS-Ⅱ IR]VAC 横紋筋肉腫中間リスク（3歳以上） Wk1-3	オンコビン注	1.5 mg/㎡ (Max: 2.0 mg/body)	点滴静注 day 1, 8	21日		
			トポテシン点滴静注	50 mg/㎡ (Max: 100 mg/body)	点滴静注 day 1-5			
2019.10.1	19430	(研)[JRS-Ⅱ HR]VAC療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 1-3週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8, 15	21日	横紋筋肉腫高リスク（3歳以上）	未
			コスメゲン静注用	0.045 mg/kg（max 2.5 mg/body）	静脈内注射 day 1			
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VI療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 4-6, 23-25, 44-46, 47-49週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	21日		
			トポテシン点滴静注	50 mg/㎡（max 100 mg/body）	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-ⅡHR]VPC療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 7-8, 11-12, 15-16, 28-29週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	14日		
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	静脈内注射 day 1, 2			
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-ⅡHR]IE療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 9-10, 13-14, 26-27, 30-31週目	注射用イホマイド	1800 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	14日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-ⅡHR]IE療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 17-19週目	注射用イホマイド	1800 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	21日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VI療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 20-22週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8, 15	21日		
			トポテシン点滴静注	50 mg/㎡（max 100 mg/body）	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-ⅡHR]VPC療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 32-34週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	21日		
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	静脈内注射 day 1, 2			
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VAC療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 35-37, 38-40週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1	21日		
			コスメゲン静注用	0.045 mg/kg（max 2.5 mg/body）	静脈内注射 day 1			
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VAC療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 41-43週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	21日		
			コスメゲン静注用	0.045 mg/kg（max 2.5 mg/body）	静脈内注射 day 1			
			注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VI療法 横紋筋肉腫高リスク（3歳以上） 50-54週目	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡（max 2.0 mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	35日		
			トポテシン点滴静注	50 mg/㎡（max 100 mg/body）	点滴静注 day 1-5			
2023.7.3		(研)[JRS-Ⅱ HR]VAC療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 1-3週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8, 15	21日	横紋筋肉腫高リスク	済
			コスメゲン静注用	0.045mg/kg（max 2.5mg/body）	静脈内注射 day 1			
			注射用エンドキサン	40mg/kg	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VI療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 4-6, 23-25, 44-46, 47-49週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	21日		
			イリノテカン点滴静注	50mg/㎡（max 100mg/body）	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-ⅡHR]VPC療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 7-8, 11-12, 15-16, 28-29週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	14日		
			テラルビシン注射用	30mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			注射用エンドキサン	40mg/kg	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-ⅡHR]IE療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 9-10, 13-14, 26-27, 30-31週目	注射用イホマイド	1800mg/㎡	点滴静注 day 1-5	14日		
			エトポシド点滴静注液	100mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-ⅡHR]IE療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 17-19週目	注射用イホマイド	1800mg/㎡	点滴静注 day 1-5	21日		
			エトポシド点滴静注液	100mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VI療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 20-22週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8, 15	21日		
			イリノテカン点滴静注	50mg/㎡（max 100mg/body）	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JRS-ⅡHR]VPC療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 32-34週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	21日		
			テラルビシン注射用	30mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			注射用エンドキサン	40mg/kg	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VAC療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 35-37, 38-40週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1	21日		
			コスメゲン静注用	0.045mg/kg（max 2.5mg/body）	静脈内注射 day 1			
			注射用エンドキサン	40mg/kg	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VAC療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 41-43週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	21日		
			コスメゲン静注用	0.045mg/kg（max 2.5mg/body）	静脈内注射 day 1			
			注射用エンドキサン	40mg/kg	点滴静注 day 1			
		(研)[JRS-Ⅱ HR]VI療法 横紋筋肉腫高リスク（1-3歳） 50-54週目	オンコビン注射用	0.05mg/kg（max 2.0mg/body）	静脈内注射 day 1, 8	35日		
			イリノテカン点滴静注	50mg/㎡（max 100mg/body）	点滴静注 day 1-5			
2024.2.6	限定	(限)ICE(IFM+CBDCA+ETP) 横紋筋肉腫	注射用イホマイド	1800 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	21日	横紋筋肉腫	済
			カルボプラチン点滴静注液	400 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			

小児　神経芽腫　院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2013.10.1	13253	(医)【05A1】CPA+VCR+THP+CDDP寛解導入 神経芽腫	注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1	28日	［ＪＮBSG］神経芽腫	済
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 1			
			テラルビシン注射用	40 mg/㎡	点滴静注 day 3			
			シスプラチン点滴静注	20 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(医)【05A3】CPA+VCR+THP+CDDP寛解導入 神経芽腫	注射用エンドキサン	1200 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2	28日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 1			
			テラルビシン注射用	40 mg/㎡	点滴静注 day 3			
			シスプラチン点滴静注	20 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(医)[09MEC]L-PAM+ETP+CBDCA 神経芽腫	アルケラン静注用	100 mg/㎡	点滴静注 day -9～-8	10日	神経芽腫強化療法	
			エトポシド点滴静注液	200 mg/㎡	点滴静注 day -7～-4			
			カルボプラチン点滴静注液	400 mg/㎡	点滴静注 day -7～-4			
2019.6.4	19419	[JN-H-15]ICE(IFM(1800)+CBDCA(400)+ETP(100)) 神経芽腫	注射用イホマイド	1800 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 3, 4, 5	28日	神経芽腫寛解導入化学療法	済
			カルボプラチン点滴静注液	400 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			エトポシド点滴静注液	67 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 3, 4, 5			
		[JN-H-15]BU+L-PAM(90)移植前大量化学療法	ブスルフェクス静注用	0.8～1.2 mg/kg×4	点滴静注 day 1～4 (day -7～-4)	7日	神経芽腫造血幹細胞移植前治療	未
			アルケラン静注用	90 mg/㎡	点滴静注 day 5, 6 (day -3, -2)			
2021.9.3	21533	(研)[JN-H-20]TC(NGT(0.75)+CPA(250)) 神経芽腫	ハイカムチン注	0.75 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	28日	神経芽腫	済
			エンドキサン注	250 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		(研)[JN-H-20]TI(TMZ(100)+CPT-11(20)) 神経芽腫	テモダール注	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	28日	神経芽腫	済
			イリノテカン点滴静注	20 mg/㎡	点滴静注 day 1-5, 8-12			
2023.4.26		(研)[JN-H-20]ICE(IFM(1800)+CBDCA(400)+ETP(100)) 神経芽腫	注射用イホマイド	1800 mg/㎡	点滴静注　day 1, 2, 3, 4, 5	28日		
			カルボプラチン点滴静注液	400 mg/㎡	点滴静注　day 1, 2			
			エトポシド点滴静注液	67 mg/㎡	点滴静注　day 1, 2, 3, 4, 5			
		(研)[JN-H-20]BU試験投与	ブスルフェクス静注用	0.4-0.6mg/kg	点滴静注 day 1	1日		
		(研)[JN-H-20]BU+L-PAM(90)移植前大量化学療法	ブスルフェクス静注用	試験投与により用量決定	点滴静注　day 1～4 (day -7～-4)	7日		
			アルケラン静注用	90 mg/㎡	点滴静注　day 5, 6 (day -3, -2)			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2022.7.22	22589	[1,3,5コース/CSF]Dinutuximab 神経芽腫	ユニツキシン点滴静注	17.5 mg/㎡	点滴静注 day 4-7	28日	大量化学療法後の神経芽腫	済
			グランシリンジ	5 μg/kg	皮下注 day 1-14			
		[2,4,6コース/IL-2]Dinutuximab 神経芽腫	ユニツキシン点滴静注	17.5 mg/㎡	点滴静注 day 8-11	28日	大量化学療法後の神経芽腫	済
			イムネース注	75 万単位/㎡ 100 万単位/㎡	点滴静注 day 1-4 点滴静注 day 8-11			
2023.2.3	限定	(限)HD-CIT(CBDCA(500)+CPT-11(50)+TMZ(250)) 神経芽腫	カルボプラチン点滴静注	500 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2	28日	神経芽腫	済
			イリノテカン点滴静注	50 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			テモダール点滴静注用	250 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
2023.11.24	限定	(限)THIO+L-PAM(total 280) 造血幹細胞移植前治療(2歳以上)	リサイオ注	200mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 8, 9	13日	神経芽腫（造血幹細胞移植前大量化学療法）	済
			アルケラン静注用	70mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 8, 9			
2023.12.1	23645	[JN-L-10]VCR+CPA 神経芽腫(LI-A)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	14日	神経芽腫（低リスク）	済
			エンドキサン注	≧10kg：300mg/㎡ ＜10kg：10mg/kg	点滴静注 day 8			
		[JN-L-10]VCR+CPA+THP 神経芽腫(LI-B)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	21日		
			エンドキサン注	≧10kg：600mg/㎡ ＜10kg：20mg/kg	点滴静注 day 1			
			テラルビシン注射用	≧10kg：30mg/㎡ ＜10kg：1mg/kg	点滴静注 day 3			
		[JN-L-10]VCR+CPA+CBDCA 神経芽腫(LI-C)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	21日		
			エンドキサン注	≧10kg：900mg/㎡ ＜10kg：30mg/kg	点滴静注 day 1			
			カルボプラチン点滴静注	≧10kg：450mg/㎡ ＜10kg：15mg/kg	点滴静注 day 1			
2023.12.1	23646	[JN-I-10]VCR+CPA+THP 神経芽腫(LI-B)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	21日	神経芽腫（中間リスク）	済
			エンドキサン注	≧10kg：600mg/㎡ ＜10kg：20mg/kg	点滴静注 day 1			
			テラルビシン注射用	≧10kg：30mg/㎡ ＜10kg：1mg/kg	点滴静注 day 3			
		[JN-I-10]VCR+CPA+CBDCA 神経芽腫(LI-C)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	21日		
			エンドキサン注	≧10kg：900mg/㎡ ＜10kg：30mg/kg	点滴静注 day 1			
			カルボプラチン点滴静注	≧10kg：450mg/㎡ ＜10kg：15mg/kg	点滴静注 day 1			
		[JN-I-10]VCR+CPA+THP+CDDP 神経芽腫(LI-D)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	28日		
			エンドキサン注	≧10kg：900mg/㎡ ＜10kg：30mg/kg	点滴静注 day 1			
			テラルビシン注射用	≧10kg：30mg/㎡ ＜10kg：1mg/kg	点滴静注 day 3			
			シスプラチン点滴静注	≧10kg：12mg/㎡ ＜10kg：0.4mg/kg	点滴静注 day 1-5			
		[JN-I-10]VCR+CPA+THP+CDDP 神経芽腫(LI-E)	オンコビン注	≧10kg：1.5mg/㎡ ＜10kg：0.05mg/kg	静脈内注射 day 1	28日		
			エンドキサン注	≧10kg：1200mg/㎡ ＜10kg：40mg/kg	点滴静注 day 1			
			テラルビシン注射用	≧10kg：40mg/㎡ ＜10kg：1.33mg/kg	点滴静注 day 3			
			シスプラチン点滴静注	≧10kg：18mg/㎡ ＜10kg：0.6mg/kg	点滴静注 day 1-5			

小児　悪性固形腫瘍　院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2014.1.8	13257	CPT-11(20) 小児悪性固形腫瘍	トポテシン点滴静注	20 mg/㎡	点滴静注 day 1-5、8-12	21日	悪性固形腫瘍	済
2014.8.8	14280	JEB(CBDCA+ETP+BLM) 小児胚細胞腫瘍	カルボプラチン点滴静注液	600 mg/㎡	点滴静注 day 2	21日	中枢神経外胚細胞腫瘍	済
			エトポシド点滴静注液	120 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 3			
			ブレオ注射用	15 mg/㎡	点滴静注 day 3			
2019.6.28	19420	(研)[PHITT]C5VD(CDDP+DXR+5-FU+VCR) 小児肝癌	シスプラチン点滴静注	30 mg/㎡（体重10kg以上） 3.3 mg/kg（体重10kg未満）	点滴静注 day 1	21日	小児肝癌	済
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡（体重10kg以上） 1.0 mg/kg（体重10kg未満）	点滴静注 day 1, 2			
			5-FU注	600 mg/㎡（体重10kg以上） 20 mg/kg（体重10kg未満）	点滴静注 day 2			
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡, max 2.0 mg/body（体重10kg以上） 0.05 mg/kg（体重10kg未満）	静注 day 2, 9 ,16			
2017.2.7	限定	(医)CITA(CDDP(80)+THP(30)) 肝芽腫	シスプラチン点滴静注	80 mg/㎡	点滴静注 day 1	28日	肝芽腫	済
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 2, 3			
2017.2.7	限定	(医)low-CITA(CDDP(40)+THP(30)) 肝芽腫	シスプラチン点滴静注	40 mg/㎡	点滴静注 day 1	28日	肝芽腫	済
			テラルビシン注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 2			
2017.8.15	限定	(医)IVADo(IFM+VCR+ACT-D+DXR) 胸膜肺芽腫	イホマイド注	3 g/㎡	点滴静注 day 1, 2, 22, 23, 43, 44	49日	胸膜肺芽腫	済
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43			
			コスメゲン静注用	1.5 mg/㎡	静注 day 1, 22, 43			
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 22, 23, 43, 44			
		(医)IVA(IFM+VCR+ACT-D) 胸膜肺芽腫	イホマイド注	3 g/㎡	点滴静注 day 1, 2	21日		
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静注 day 1, 8, 15			
			コスメゲン静注用	1.5 mg/㎡	静注 day 1			
2021.	21519	[JWiTS/EE-4A]ACT-D 腎芽腫 Wk0	コスメゲン静注用	0.045 mg/kg (＜30kg) 1.35 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	1日	ウィルムス腫瘍（腎芽腫）	済
		[JWiTS/EE-4A]VCR 腎芽腫 Wk1-	オンコビン注射用	0.05 mg/kg (＜30kg) 1.5 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1, 8	14日	ウィルムス腫瘍（腎芽腫）	
		[JWiTS/EE-4A]ACT-D+VCR 腎芽腫 Wk3, 6-	コスメゲン静注用	0.045 mg/kg (＜30kg) 1.35 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	21日	ウィルムス腫瘍（腎芽腫）	
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg (＜30kg) 1.5 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1, 8, 15			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
6.1	[illegible]	[JWiTS/EE-4A]ACT-D+VCR 腎芽腫 Wk9-	コスメゲン静注用	0.045 mg/kg (＜30kg) 1.35 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	21日	ウィルムス腫瘍（腎芽腫）	済
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg (＜30kg) 1.5 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1, 8			
		[JWiTS/EE-4A]ACT-D+VCR 腎芽腫 Wk12, 15, 18-	コスメゲン静注用	0.045 mg/kg (＜30kg) 1.35 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	21日	ウィルムス腫瘍（腎芽腫）	
			オンコビン注射用	0.067 mg/kg	静注 day 1			
2021.12.14	21556	THIO(200)+L-PAM(70) 造血幹細胞移植前治療	リサイオ注	200 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2, 8, 9 （day -12, -11, -5, -4）	13日	小児悪性固形腫瘍	済
			アルケラン静注用	70 mg/㎡	点滴静注 day 2, 8, 9 （day -11, -5, -4）			
		【腎機能低下例】THIO(200)+L-PAM(70) 造血幹細胞移植前治療	リサイオ注	200 mg/㎡	点滴静注 day 1, 4（day -7, -4）	8日		
			アルケラン静注用	70 mg/㎡	点滴静注 day 1, 4（day -7, -4）			
2021.12.14	21557	[JWiTS-2/I]DXR 腎芽腫 Wk0	ドキソルビシン塩酸塩注	1.5 mg/kg (＜30kg) 45 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	2日	ウィルムス腫瘍（腎芽腫）	済
		[JWiTS-2/I]VCR 腎芽腫 Wk1-	オンコビン注射用	0.05 mg/kg (＜30kg) 1.5 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1, 8	14日		
		[JWiTS-2/I]CPA+ETP+VCR 腎芽腫 Wk3, 9-	注射用エンドキサン	14.7 mg/kg (＜30kg) 440 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-5	21日		
			エトポシド点滴静注液	3.3 mg/kg (＜30kg) 100 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-5			
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg (＜30kg) 1.5 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 8, 15			
		[JWiTS-2/I]DXR+CPA+VCR 腎芽腫 Wk6-	ドキソルビシン塩酸塩注	1.5 mg/kg (＜30kg) 45 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	21日		
			注射用エンドキサン	14.7 mg/kg (＜30kg) 440 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-3			
			オンコビン注射用	0.05 mg/kg (＜30kg) 1.5 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1, 8, 15			
		[JWiTS-2/I]DXR+CPA+VCR 腎芽腫 Wk12-	ドキソルビシン塩酸塩注	1.5 mg/kg (＜30kg) 45 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	21日		
			注射用エンドキサン	14.7 mg/kg (＜30kg) 440 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-3			
			オンコビン注射用	0.067 mg/kg (＜30kg) 2.0 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1, 8			
		[JWiTS-2/I]CPA+ETP 腎芽腫 Wk15, 21-	注射用エンドキサン	14.7 mg/kg (＜30kg) 440 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-5	21日		
			エトポシド点滴静注液	3.3 mg/kg (＜30kg) 100 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-5			
		[JWiTS-2/I]DXR+CPA+VCR 腎芽腫 Wk18, 24-	ドキソルビシン塩酸塩注	1.5 mg/kg (＜30kg) 45 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1	21日		
			注射用エンドキサン	14.7 mg/kg (＜30kg) 440 mg/㎡ (≧30kg)	点滴静注 day 1-3			
			オンコビン注射用	0.067 mg/kg (＜30kg) 2.0 mg/㎡ (≧30kg)	静注 day 1			
2022.6.9	限定	(限IPO(CPT-11(200)+PTX(80)+L-OHP(200)) 精巣癌:3rd	イリノテカン点滴静注	200 mg/㎡	点滴静注 day 1	21日	難治性精巣癌3次治療	済
			パクリタキセル点滴静注液	80 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15			
			エルプラット点滴静注液	200 mg/㎡	点滴静注 day 1			

小児　脳腫瘍　院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2009.10.26	09109	ICE(IFM(900)+CDDP(20)+ETP(60)) 頭蓋内胚細胞系腫瘍	イホマイド注	900 mg/㎡	点滴静注 day 1-5	28日	頭蓋内胚細胞系 腫瘍	済
			シスプラチン点滴静注	20 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
			エトポシド点滴静注液	60 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
2011.3.11	10155	Temozolomide(75) 悪性神経膠腫 放射線併用	テモダール点滴静注用	75 mg/㎡	点滴静注 day 1-42	70日	悪性神経膠腫 （ｶﾞﾝ剤の 内服困難例）	済
		Temozolomide(150) 悪性神経膠腫 初発維持･再発	テモダール点滴静注用	150 mg/㎡ (2ｺｰｽ目以降200 mg/㎡まで 増量可)	点滴静注 day 1-5	28日		
2013.8.6	13241	【RT】BEV(10)+TMZ(75) 悪性神経膠腫 初発	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15, 29, 42	70日	悪性神経膠腫:初発 放射線化学療法	済
			テモゾロミド錠	75 mg/㎡	経口投与 day 1-42			
2013.8.6	13242	【維持】BEV(10)+TMZ(150) 悪性神経膠腫	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日	悪性神経膠腫 術後化学療法	済
			テモゾロミド錠 またはテモダール点滴静注用	150 mg/㎡ （2回目以降200mg/㎡まで増量可）	経口投与 day 1-5 または点滴静注 day 1-5			
2013.8.6	13243	【3週】Bevacizumab(15) 悪性神経膠腫	アバスチン点滴静注用	15 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	悪性神経膠腫 術後化学療法	済
2013.8.6	13244	【2週】Bevacizumab(10) 悪性神経膠腫:再発	アバスチン点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1	14日	悪性神経膠腫 再発例	済
2014.4.8	14268	VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース1	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 0	14日	再発難治性 脳腫瘍	済
			カルボプラチン点滴静注液	550 mg/㎡	点滴静注 day 0			
		VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース2	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 1	14日		
			注射用メソトレキセート メソトレキセート点滴静注液	800 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート メソトレキセート点滴静注液	7200 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース3	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈内注射 day 1	14日		
			注射用エンドキサン	1500 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		VCR+CBDCA+MTX+CPA+CDDP 再発難治性脳腫瘍 コース4	シスプラチン点滴静注	40 mg/㎡	点滴静注 day 1-2	14日		
2014.6.3	14272	L-PAM(60)+CPA(1500) 自家末梢血幹細胞移植	アルケラン静注用	60 mg/㎡	点滴静注 day 5-7	9日	再発難治性 脳腫瘍	済
			注射用エンドキサン	1500 mg/㎡	点滴静注 day 1-4			
2015.5.7	15298	CBDCA(500)+ETP(100) 髄芽腫R1	カルボプラチン点滴静注液	500 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2	21日	髄芽腫	済
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		CPA(1500)+ETP(100) 髄芽腫R2	注射用エンドキサン	1500 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2	21日		
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-5			
		weekly VCR(1.5)+RT 髄芽腫	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	点滴静注 day 1	7日		
2018.2.28	限定	(医)CPA(800)＋VCR(1.5)＋MTX(2) 髄芽腫 Week1	注射用エンドキサン	800 mg/㎡	点滴静注 day 1-3	14日	髄芽腫	済
			オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈注射 day 1			
			注射用メソトレキセート	2 mg/body	髄腔内投与 day 1-4			
		(医)MTX(5000)＋VCR(1.5)＋MTX(2) 髄芽腫 Week3, 5	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	静脈注射 day 1	14日		
			注射用メソトレキセート メソトレキセート点滴静注液	5000 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	2 mg/body	髄腔内投与 day 1, 2			
		(医)CBDCA(200)＋ETP(150)＋MTX(2) 髄芽腫 Week7	カルボプラチン点滴静注液	200 mg/㎡	点滴静注 day 1-3	14日		
			エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
			注射用メソトレキセート	2 mg/body	髄腔内投与 day 1-4			
2018.3.2	限定	(医)VDC(VCR(1.5)+DXR(37.5)+CPA(1800)) /VDC-ICE 脳腫瘍	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	脳腫瘍	済
			ドキソルビシン塩酸塩注射用	37.5 mg/㎡	点滴静注 day 1 (48hr)			
			注射用エンドキサン	1.8 g/㎡	点滴静注 day 1			
		(医)ICE(IFM(2000)+CBDCA(600)+ETP(100)) /VDC-ICE 脳腫瘍	イホマイド注	2 g/㎡	点滴静注 day 1-3	21日		
			カルボプラチン点滴静注液	600 mg/㎡	点滴静注 day 1			
			エトポシド点滴静注液	100 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			
2018.4.3	18388	【SIOP LGG2004】VCR(1.5)+CBDCA(550) Week 1～, 4～, 7～	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡(最大2 mg)	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	脳腫瘍	済
			カルボプラチン点滴静注液	550 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		【SIOP LGG2004】VCR(1.5)+CBDCA(550) Week 10	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡(最大2 mg)	点滴静注 day 1	21日		
			カルボプラチン点滴静注液	550 mg/㎡	点滴静注 day 1			
		【SIOP LGG2004】VCR(1.5)+CBDCA(550) Week 13～, 17～, 21～	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡(最大2 mg)	点滴静注 day 1	28日		
			カルボプラチン点滴静注液	550 mg/㎡	点滴静注 day 1			

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
		【SIOP LGG2004】VCR(1.5)+CBDCA(550) Week 24～	オンコビン注射用	1.5 mg/㎡(最大2 mg)	点滴静注 day 1, 8, 15	42日		
			カルボプラチン点滴静注液	550 mg/㎡	点滴静注 day 1			
2020.6.2	20457	(研)[JCCG EPN1501] 小児上衣腫(E-A)	オンコビン注射用	10kg以上：1.5 mg/㎡(最大2 mg) 10kg未満：0.05 mg/kg	静脈内注射 day 1, 8	28日	脳腫瘍	済
			注射用エンドキサン	10kg以上：1 g/㎡ 10kg未満：33 mg/kg	点滴静注 day 1, 2			
			カルボプラチン点滴静注液	10kg以上：375 mg/㎡ 10kg未満：12.5 mg/kg	点滴静注 day 1			
		(研)[JCCG EPN1501] 小児上衣腫(E-B)	オンコビン注射用	10kg以上：1.5 mg/㎡(最大2 mg) 10kg未満：0.05 mg/kg	静脈内注射 day 1, 8	28日		
			エトポシド点滴静注液	10kg以上：150 mg/㎡ 10kg未満：5 mg/kg	点滴静注 day 1-3			
			カルボプラチン点滴静注液	10kg以上：375 mg/㎡ 10kg未満：12.5 mg/kg	点滴静注 day 1			
2022.1.14	21562	(研)[JCCG AT20]VTP ラブドイド腫瘍	オンコビン注射用	0.05 mg/kg (3カ月-1歳) 1.5 mg/㎡ (≧1歳)	点滴静注 day 1	21日	ラブドイド腫瘍	済
			テラルビシン注射用	37.5 mg/㎡	点滴静注 day 1, 2			
			シスプラチン点滴静注	90 mg/㎡	点滴静注 day 2			
			注射用メソトレキセート	6 mg/body (3カ月-1歳) 8 mg/body (1歳) 10 mg/body (2歳) 12 mg/body (≧3歳)	髄注 day1（コース5） 髄注 day1, 8（コース1, 3）			
			ソル・コーテフ注	10 mg/body (3カ月-1歳) 15 mg/body (1歳) 20 mg/body (2歳) 25 mg/body (≧3歳)				
		(研)[JCCG AT20]VAC ラブドイド腫瘍	オンコビン注射用	0.05 mg/kg (3カ月-1歳) 1.5 mg/㎡ (≧1歳)	点滴静注 day 1	21日	ラブドイド腫瘍	済
			コスメゲン静注用	0.01 mg/kg (＜1歳) 0.015 mg/kg (≧1歳)	点滴静注 day 1-5			
			エンドキサン注	73 mg/kg (1-3歳) 2200 mg/㎡ (≧4歳)	点滴静注 day 1			
			注射用メソトレキセート	6 mg/body (3カ月-1歳) 8 mg/body (1歳) 10 mg/body (2歳) 12 mg/body (≧3歳)	髄注 day1（コース4, 6） 髄注 day1, 8（コース2）			
			ソル・コーテフ注	10 mg/body (3カ月-1歳) 15 mg/body (1歳) 20 mg/body (2歳) 25 mg/body (≧3歳)				
2023.9.22		(研)[JCCG AT20]HDC-TM(THIO+L-PAM) ラブドイド腫瘍	リサイオ注	200mg/㎡（2歳以上） 8mg/kg（2歳未満）	点滴静注 day 1, 2, 8, 9	13日	ラブドイド腫瘍	済
			アルケラン静注用	70mg/㎡（2歳以上） 1.5mg/kg（2歳未満）	点滴静注 day 2, 8, 9 点滴静注 day 1, 2, 8, 9			
2022.3.1	21567	(研)CARE(CBDCA(450)+ETP(150)) 頭蓋内胚細胞腫	カルボプラチン点滴静注液	450 mg/㎡	点滴静注 day 1	28日	頭蓋内胚細胞腫	済
			エトポシド点滴静注液	150 mg/㎡	点滴静注 day 1-3			