

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2008.7.24	08032	Rituximab(375) 悪性リンパ腫	リツキシマン注	375 mg/m ²	点滴静注 day 1	1日	CD20陽性 非ホジキンリンパ腫	済
2008.7.24	08033	CHOP14 悪性リンパ腫	水溶性プレドニ注 プレドニ錠 注射用エンドキサン ドキソリビシン塩酸塩注射用 オンコピン注射用	100 mg/body 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	悪性リンパ腫	済
2008.7.24	08034	CHOP21 悪性リンパ腫	水溶性プレドニ注 プレドニ錠 注射用エンドキサン ドキソリビシン塩酸塩注射用 オンコピン注射用	100 mg/body 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	21日	悪性リンパ腫	削除
2008.7.24	08035	THP-COP14 悪性リンパ腫	水溶性プレドニ注 プレドニ錠 注射用エンドキサン テラルピシン注射用 オンコピン注射用	100 mg/body 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	14日	悪性リンパ腫	済
2008.7.24	08036	THP-COP21 悪性リンパ腫	水溶性プレドニ注 プレドニ錠 注射用エンドキサン テラルピシン注射用 オンコピン注射用	100 mg/body 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	21日	悪性リンパ腫	削除
2008.7.24	08037	(医)IMVP-16+CBDC 悪性リンパ腫	注射用ソル・メルコート 注射用イホマイド エトボシド点滴静注液 カルボプラチン点滴静注液 注射用メソトレキセート	1000 mg/body 1000 mg/m ² 80 mg/m ² 300 mg/m ² 30 mg/m ²	点滴静注 day 1-3 点滴静注 day 1-5 点滴静注 day 1-3 点滴静注 day 1 点滴静注 day 3, 10	21日	悪性リンパ腫	済
2008.9.30 2013.2.5	08057	[静注] Bortezomib(1.3) 多発性骨髄腫 [皮下注] Bortezomib(1.3) 多発性骨髄腫	ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	点滴静注 day 1, 4, 8, 11 皮下注射 day 1, 4, 8, 11	21日	多発性骨髄腫	済
2008.9.30 2013.2.5	08058	[静注]Bortezomib(1.3)維持療法 多発性骨髄腫 [皮下注]Bortezomib(1.3) 維持療法 多発性骨髄腫	ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	点滴静注 day 1 皮下注射 day 1	35日	多発性骨髄腫	済
2009.5.26	09088	R-CHOP 悪性リンパ腫	リツキシマン注 注射用エンドキサン ドキソリビシン塩酸塩注射用 オンコピン注射用 水溶性プレドニ注 プレドニ錠	375 mg/m ² 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ² 100 mg/body	点滴静注 day 1 点滴静注 day 3 点滴静注 day 3 点滴静注 day 3 点滴注射 day 3 経口投与 day 4-7	21日	悪性リンパ腫	済
2009.5.26	09089	R-THPCOP 悪性リンパ腫	リツキシマン注 注射用エンドキサン テラルピシン注射用 オンコピン注射用 水溶性プレドニ注 プレドニ錠	375 mg/m ² 750 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ² 100 mg/body	点滴静注 day 1 点滴静注 day 3 点滴静注 day 3 点滴静注 day 3 点滴注射 day 3 経口投与 day 4-7	21日	悪性リンパ腫	済
2009.5.26	09090	Cladribine(0.12) 悪性リンパ腫	ロイスタチン注	0.12 mg/kg	持続静注 day 1-5	21日	悪性リンパ腫 (再発・再燃治療抵抗性 悪性リンパ腫)	削除
2009.8.25	09096	ABVd(DXR+BLM+VLB+DTIC) ホジキン病:1st	ドキソリビシン塩酸塩注射用 プレオ注射用 エクザール注射用 ダカルバジン注用	25 mg/m ² 10 mg/m ² 6 mg/m ² 250 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1	13日	ホジキン病	済
2011.1.28	10154	Bendamustine(120) 低悪性度Bリンパ腫	トレアキシ点点滴静注用	120 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	21日	再発または難治性の 低悪性度B細胞性 非ホジキンリンパ腫	済
2011.3.25	10156	Azacitidine(75) 骨髄異形成症候群	ピダーザ注射用	75 mg/m ²	点滴静注 (or皮下注射) day 1-7	28日	骨髄異形成症候群	済
2011.10.4	11187	R(375)+BM(90) 低悪性度Bリンパ腫	リツキシマン注 トレアキシ点点滴静注用	375 mg/m ² 90 mg/m ²	点滴静注 day1 点滴静注 day 1, 2	28日	低悪性度B細胞性 非ホジキンリンパ腫	済
2012.6.28	12208	Gemtuzumab Ozogamicin(9) CD33陽性急性骨髄性白血病	マイロターグ点滴静注用	9 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	CD33陽性急性骨髄性白血病 再発・難治例	済
2012.10.2	12213	AV(ETP(50)+Ara-C(20)) 高齢者急性骨髄性白血病	エトボシド点滴静注液 キロサイド注 イダマイシン静注用	50 mg/body 20 mg/body 12 mg/m ²	点滴静注 day 1-14 点滴静注 day 1-14 点滴静注 day 1-3	28日	高齢者急性骨髄性白血病	済
2012.10.2	12214	[AML201] IDR(12)+Ara-C(100) 寛解導入療法① [AML201] DNR(50)+Ara-C(100) 寛解導入療法② [AML201] MIT(7)+Ara-C(200) 地固め療法① [AML201] DNR(50)+Ara-C(200) 地固め療法② [AML201] ACR(20)+Ara-C(200) 地固め療法③ [AML201] Ara-C+ETP+VCR+VDS 地固め療法④ [AML201] Ara-C大量(2000) 地固め療法	キロサイド注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-7	21日	急性骨髄性白血病	済
			ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日		済
			キロサイド注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-7	21日		済
			ノバントロン注	7 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	21日		済
			キロサイド注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日		済
			ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	21日		済
			キロサイド注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日		済
			アクリノリン注射用	20 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日		済
			キロサイド注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1-5	21日		済
			エトボシド点滴静注液 キロサイド注 オンコピン注射用 注射用フィルデシン	100 mg/m ² 200 mg/m ² 0.8 mg/m ² 2 mg/m ²	点滴静注 day 1-5 点滴静注 day 1-5 点滴静注 day 8 点滴静注 day 10	21日		済
シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ² /回 ×1日2回	点滴静注 day 1-5	21日	済				
2013.4.2	13232	(医)R(375)+BM(90)+Ara-C(600) 濾胞性リンパ腫	リツキシマン注 トレアキシ点点滴静注用 キロサイド注	375 mg/m ² 90 mg/m ² 600 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 2, 3 点滴静注 day 2-4	28日	再発・難治性ハイリスク 濾胞性リンパ腫及び マントル細胞リンパ腫	済
2013.4.2	13233	SMILE 再発・難治性NK/T細胞性リンパ腫	注射用メソトレキセート メソトレキセート点滴静注液 注射用イホマイド エトボシド点滴静注液 ロイナーゼ注用	2000 mg/m ² 1500 mg/m ² 100 mg/m ² 6000 U/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 2-4 点滴静注 day 2-4 点滴静注もしくは筋注 day 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	28日	再発・難治性 NK/T細胞性リンパ腫	済
2013.6.4	13237	GDP (GEM(1000)+CCDP(75)+DEX(40)) 再発・難治性リンパ腫	ゲムシタピン点滴静注液 シスプラチン点滴静注 デキサメタゾン注	1000 mg/m ² 75 mg/m ² 40 mg/body	点滴静注 day 1, 8 点滴静注 day 1 点滴静注 day 1-4	21日	再発・難治性リンパ腫	削除

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録				
2013.7.29	13240	Mogamulizumab(1) CCR4陽性ATLL	ボテリジオ点滴静注	1 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50	56日	CCR4陽性ATLL	済				
2013.10.1	13255	(医)Ara-C+CPA 非血縁者間臍帯血移植前処置	シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	4日	AML・ALL・MDS 非血縁者間臍帯血移植前処置	済				
			注射用エンドキサン	60 mg/kg/day	点滴静注 day 3							
			ノイトロジン注	5 µg/kg	点滴静注 day 1, 2							
2014.2.4	13261	(医)GCD±R 再発・難治性悪性リンパ腫	ゲムシタピン点滴静注液	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	21日	再発・難治性 悪性リンパ腫	済				
			カルボプラチン点滴静注液	AUC 5	点滴静注 day 1							
			デキササート注	40 mg	点滴静注 day 1-4							
			リツキサン注	375 mg/m ²	点滴静注 day 8							
2014.2.27	13264	【JALSG ALL202-U <25歳(CNS-)】 維持療法①⑤⑨⑬	注射用メソトレキセート	150 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15, 29	42日	急性リンパ性白血病 維持療法 (①~④、②~⑧、③~⑫、 ⑬~⑯というように、 4コースを4サイクル行)	済				
			メソトレキセート点滴静注液									
			ロイケリン散	50 mg/m ²	経口投与 day 1-28							
			注射用メソトレキセート	12 mg	静注 day 29							
	【JALSG ALL202-U <25歳(CNS-)】 維持療法②⑥⑩⑭	オンコピン注射用	1.5 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	急性リンパ性白血病 維持療法 (①~④、②~⑧、③~⑫、 ⑬~⑯というように、 4コースを4サイクル行)	済					
		注射用エンドキサン	600 mg/m ²	点滴静注 day 8								
		ロイナーゼ注用	10000 U/m ²	筋注 day 2, 9, 16								
		プレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 1-14 (day 15~tapered)								
	【JALSG ALL202-U <25歳(CNS-)】 維持療法③⑦⑪⑮	注射用メソトレキセート	150 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15, 29	42日	急性リンパ性白血病 維持療法 (①~④、②~⑧、③~⑫、 ⑬~⑯というように、 4コースを4サイクル行)	済					
		メソトレキセート点滴静注液										
		ロイケリン散	50 mg/m ²	経口投与 day 1-28								
		注射用メソトレキセート	12 mg	静注 day 29								
	【JALSG ALL202-U <25歳(CNS-)】 維持療法④⑧⑫⑯	オンコピン注射用	1.5 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	急性リンパ性白血病 維持療法 (①~④、②~⑧、③~⑫、 ⑬~⑯というように、 4コースを4サイクル行)	済					
		テラルピシン注射用	25 mg/m ²	点滴静注 day 8								
		ロイナーゼ注用	10000 U/m ²	筋注 day 2, 9, 16								
		プレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 1-14 (day 15~tapered)								
2015.6.2	13264	【JALSG ALL202-U <25歳】 Induction (1~5週)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	点滴静注 day 8, 15, 22, 29	35日	急性リンパ性白血病	済				
			テラルピシン注射用	25 mg/m ²	点滴静注 day 8, 9							
			注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	点滴静注 day 10							
			ロイナーゼ注用	6000 U/m ²	点滴静注または筋注 day 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29							
			デキササート注	10 mg/m ²	点滴静注 day 8-14							
			プレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与または点滴静注 day 1-7							
			プレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 15-28 (day 29~tapered)							
			注射用メソトレキセート	12 mg/body	静注 day 1							
			注射用メソトレキセート	12 mg/body								
			キロサイド注	30 mg/body	静注 day 8, 22							
			ソル・コーテフ注射用	25 mg/body								
			【JALSG ALL202-U <25歳】 Consolidation (6~9週)	注射用エンドキサン	750 mg/m ²				点滴静注 day 1, 8	28日	急性リンパ性白血病	済
				テラルピシン注射用	25 mg/m ²				点滴静注 day 1, 2			
				キロサイド注	75 mg/m ²				点滴静注 day 1-6, 8-13			
				ロイケリン散	50 mg/m ²				経口投与 day 1-14			
				注射用メソトレキセート	12 mg/body							
キロサイド注	30 mg/body	静注 day 1, 8										
【JALSG ALL202-U <25歳】 Sanctuary (10~11週)	注射用メソトレキセート	3000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	14日	急性リンパ性白血病	済						
	注射用メソトレキセート	12 mg/body										
	キロサイド注	30 mg/body	静注 day 2, 9									
	ソル・コーテフ注射用	25 mg/body										
【JALSG ALL202-U <25歳】 Reinduction (12~15週)	オンコピン注射用	1.5 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	急性リンパ性白血病	済						
	テラルピシン注射用	25 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8									
	注射用エンドキサン	500 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8									
	ロイナーゼ注用	6000 U/m ²	筋肉内注射 day 1, 3, 5, 8, 10, 12									
	プレドニン錠	40 mg/m ²	経口投与 day 1-14 (day 15~tapered)									
	注射用メソトレキセート	12 mg/body	静注 day 1									
【JALSG ALL202-U <25歳】 Reconsolidation (16~19週)	注射用エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注 day 1, 8	28日	急性リンパ性白血病	済						
	テラルピシン注射用	25 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2									
	キロサイド注	75 mg/m ²	点滴静注 day 1-6, 8-13									
	ロイケリン散	50 mg/m ²	経口投与 day 1-14									
	注射用メソトレキセート	12 mg/body										
	キロサイド注	30 mg/body	静注 day 1, 8									
2014.4.8	14266	Hyper-CVAD (CPA+VCR+DXR+DEX) ALL・ML	注射用エンドキサン	300 mg/m ² ×2回	点滴静注 day 1-3	21日	急性リンパ性白血病 ・悪性リンパ腫	済				
			オンコピン注射用	2 mg/body	静脈内注射 day 4, 11							
			ドキシソリン塩酸塩注射用	50 mg/m ²	点滴静注 day 4							
			デキササート注	40 mg/body	点滴静注 day 1-4, 11-14							
			注射用メソトレキセート	200 mg/m ²	点滴静注 day 1							
HD-MTX(200・800)+Ara-C(2000) ALL・ML	メソトレキセート点滴静注液	800 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	急性リンパ性白血病 ・悪性リンパ腫	済						
	メソトレキセート点滴静注液	800 mg/m ²	点滴静注 day 1									
	シタラピン点滴静注液	2 g/m ² ×2回	点滴静注 day 1-3									
	注射用ソル・メルコート	40 mg/body×2回	点滴静注 day 2, 3									
	MTX静注 [Hyper-CVAD/HD-MTX-Ara-C]	注射用メソトレキセート	12 mg/body				静注 day 1 (Hyper-CVAD/HD-MAの day 2に施行予定)	1日	急性リンパ性白血病 ・悪性リンパ腫	済		
Ara-C静注 [Hyper-CVAD/HD-MTX-Ara-C]	キロサイド注	100 mg/body	静注 day 1 (Hyper-CVAD/HD-MAの day 8に施行予定)	1日	急性リンパ性白血病 ・悪性リンパ腫	済						

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2014.6.3	14273	[induction]R-MPV 脳悪性B細胞性リンパ腫	リツキサン注	375 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	脳悪性B細胞性リンパ腫	済
			注射用メソトレキセート	3500 mg/m ²	点滴静注 day 2			
			メソトレキセート点滴静注液					
			オンコピン注射用	1.4 mg/m ²	点滴静注 day 2			
			塩酸プロカルバジンカプセル	100 mg/m ²	経口投与 day 2-8 奇数コースのみ併用			
			ロイコボリン注	25 mg/body	点滴静注 day 3-5			
		MTX ommaya/R-MPV 脳悪性B細胞性リンパ腫	注射用メソトレキセート	12 mg/body	脳脊髄腔内注射 day 1 (R-MPVのday 5-12の間に施行)	1日	脳悪性B細胞性リンパ腫	済
		[consolidation]Ara-C/R-MPV 脳悪性B細胞性リンパ腫	シタラビン点滴静注液	3000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	28日	脳悪性B細胞性リンパ腫	済
2014.12.2	14285	CHASE(CPA+DEX+Ara-C+ETP) 悪性リンパ腫	注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	再発・難治性悪性リンパ腫	済
		デキサメタゾン注	40 mg/body	点滴静注 day 1-3				
		シタラビン点滴静注液	2000 mg/m ²	点滴静注 day 2, 3				
			エトボシド点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
2014.12.2	14286	[Level -2] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	50 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済
			オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			ドキシソルビシン塩酸塩注射用	10 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			注射用エンドキサン	480 mg/m ²	点滴静注 day 5			
			プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5			
		[Level -1] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	50 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済
			オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			ドキシソルビシン塩酸塩注射用	10 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			注射用エンドキサン	600 mg/m ²	点滴静注 day 5			
			プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5			
		[Level 1] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	50 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済
			オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			ドキシソルビシン塩酸塩注射用	10 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			注射用エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注 day 5			
			プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5			
		[Level 2] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	60 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済
			オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			ドキシソルビシン塩酸塩注射用	12 mg/m ²	持続点滴 day 1-4			
			注射用エンドキサン	900 mg/m ²	点滴静注 day 5			
			プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5			
[Level 3] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	72 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済		
	オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	14.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	注射用エンドキサン	1080 mg/m ²	点滴静注 day 5					
	プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5					
[Level 4] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	86.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済		
	オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	17.3 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	注射用エンドキサン	1296 mg/m ²	点滴静注 day 5					
	プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5					
[Level 5] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	103.7 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済		
	オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	20.7 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	注射用エンドキサン	1555 mg/m ²	点滴静注 day 5					
	プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5					
[Level 6] dose adjusted EPOCH 悪性リンパ腫	エトボシド点滴静注液	124.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4	21日	非ホジキンリンパ腫	済		
	オンコピン注射用	0.4 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	ドキシソルビシン塩酸塩注射用	24.8 mg/m ²	持続点滴 day 1-4					
	注射用エンドキサン	1866 mg/m ²	点滴静注 day 5					
	プレドニ錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5					
2014.12.2	14287	CVP(CPA+VCR+PSL) 悪性リンパ腫	注射用エンドキサン	750 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	低悪性度 非ホジキンリンパ腫	済
		オンコピン注射用	1.4 mg/m ²	点滴静注 day 1				
		水溶性プレドニ	100 mg/day	点滴静注 day 1				
		プレドニ錠	100 mg/day	経口投与 day 2-5				
2015.2.3	14293	[1回目]Ofatumumab(300) CD20陽性慢性リンパ性白血病		300 mg/body	点滴静注 day 1	7日	CD20陽性 慢性リンパ性白血病	削除
		[2-7回目]Ofatumumab(2000) CD20陽性慢性リンパ性白血病	アーゼラ点滴静注液	200 mg/body	点滴静注 day 1	7日		
		[8-12回目]Ofatumumab(2000) CD20陽性慢性リンパ性白血病		200 mg/body	点滴静注 day 1 (9回目投与は8回目投与の 4-5週間後から開始)	28日		
2015.4.10	15297	CSP+MTX 移植後GVHD予防	注射用メソトレキセート	15 mg/m ² 10 mg/m ²	点滴静注 day 1 点滴静注 day 3, 6, 11	14日	自己末梢血幹細胞移植後 GVHD予防 (白血病、リンパ腫、 骨髄異型性症候群)	済
2015.6.2	15299	MEC(MIT(5)+ETP(80)+Ara-C(100)) 白血病:再発・難治	ノバントロン注	5 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	14日	白血病:再発・難治	済
		エトボシド点滴静注液	80 mg/m ²	点滴静注 day 1-5				
		キロサイド注	100 mg/m ²	点滴静注 day 1-7				
2015.8.4	15304	Brentuximab(1.8) CD30陽性 HL・ALCL	アドセトリス点滴静注用	1.8 mg/kg	点滴静注 day 1	21日	CD30陽性 ホジキンリンパ腫・ 未分化大細胞リンパ腫	済
2015.10.6	15307	[1~8コース] Panobinostat+VD(BOR+DEX) 多発性骨髄腫	ファリーダック錠	20 mg/day	経口投与 day 1,3,5,8,10,12	21日	多発性骨髄腫	削除
			ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	静注または皮下注 day 1,4,8,11			
			デキサメタゾン注射液または レナデックス錠	20 mg/day	点滴静注または経口投与 day 1,2,4,5,,8,9,11,12			
		ファリーダック錠	20 mg/day	経口投与 day 1,3,5,8,10,12,22,24,26, 29,31,33	42日			
		ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	静注または皮下注 day 1,8,22,29				
		デキサメタゾン注射液または レナデックス錠	20 mg/day	点滴静注または経口投与 day 1,2,8,9,22,23,29,30				

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録		
2015.12.1	15310	[LSG15] VCAP 成人T細胞白血病・リンパ腫	オンコピン注射用	1 mg/m	点滴静注 day 1	28日	成人T細胞白血病・リンパ腫	済		
			注射用エンドキサン	350 mg/m	点滴静注 day 1					
			ドキシルビシン塩酸塩注	40 mg/m	点滴静注 day 1					
			ブレドニン錠	40 mg/m	経口投与 day 1					
		[LSG15] AMP 成人T細胞白血病・リンパ腫	ドキシルビシン塩酸塩注	430mg/m	点滴静注 day 8					
			注射用サイメリン	60mg/m	点滴静注 day 8					
			ブレドニン錠	40mg/m	経口投与 day 8					
		[LSG15] VECP 成人T細胞白血病・リンパ腫	注射用フィルデシン	2.4mg/m	点滴静注 day 15					
			エトボシド点滴静注液	100mg/m	点滴静注 day 15					
カルボプラチン点滴静注液	250mg/m		点滴静注 day 15							
		ブレドニン錠	40mg/m	経口投与 day 15						
2015.12.1	15311	L-PAM(100) 自家造血幹細胞移植前 多発性骨髄腫	アルケラン静注用	100mg/m	点滴静注 day 1, 2	21日	自家造血幹細胞移植前 多発性骨髄腫	済		
2016.6.7	15296	(医)M(B)EAM移植前化学療法	注射用サイメリン	300 mg/m	点滴静注 day 1	14日	悪性リンパ腫 自己末梢血幹細胞移植	済		
			エトボシド点滴静注液	100 mg×2/m	点滴静注 day 2-5					
			キロサイド注	200 mg×2/m	点滴静注 day 2-5					
			アルケラン静注用	140 mg/m	点滴静注 day 6					
2016.10.4	16343	【APL C9710】 ATO(0.15)地固め療法①	トリセノックス注	0.15 mg/kg	点滴静注 day 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-33	49日	再発・難治性 急性前骨髄球性白血病	済		
			【APL C9710】 ATRA(45)+DNR(50)地固め療法②	ベサノイドカプセル	45 mg/m	経口投与 day 1-7			21日	
				ダウノマイシン静注用	50 mg/m	点滴静注 day 1-3				
2016.10.4	16344	[1コース目]【静注】 KRd療法 多発性骨髄腫	カイプロリス点滴静注用	20 mg/m	点滴静注 day 1, 2	28日	多発性骨髄腫 2次・3次治療、再発例	済		
				27 mg/m	点滴静注 day 8, 9, 15, 16					
				レブラミドカプセル	25 mg/body				経口投与 day 1-21	
		[2-12コース]【静注】 KRd療法 多発性骨髄腫		40 mg/body	経口投与 day 1, 8, 15, 22	28日				
				4 mg/body	経口投与 day 2, 9, 16					
			カイプロリス点滴静注用	27 mg/m	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16					
		[13-18コース]【静注】 KRd療法 多発性骨髄腫		25 mg/body	経口投与 day 1-21	28日				
				40 mg/body	経口投与 day 1, 8, 15, 22					
				4 mg/body	経口投与 day 2, 9, 16					
2016.10.4	16345	(医)【GHSG-SCT1101】 FLU+Ara-C(4日)+CPA 造血幹細胞移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/m	点滴静注 day 1-5	7日	急性骨髄性 白血病 急性リンパ性白血病 骨髄異形成 症候群	済		
				シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ² ×2				点滴静注 day 2-5	
				注射用エンドキサン	50 mg/kg				点滴静注 day 6	
				グランシリンジ	200 µg/m				点滴静注 day 1-5	
		(医)【GHSG-SCT1101】 FLU+Ara-C(3日)+CPA 造血幹細胞移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/m	点滴静注 day 1-5	7日				
				シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ² ×2				点滴静注 day 3-5	
				注射用エンドキサン	50 mg/kg				点滴静注 day 6	
				グランシリンジ	200 µg/m				点滴静注 day 1-5	
		(医)【GHSG-SCT1101】 FLU+Ara-C(2日)+CPA 造血幹細胞移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/m	点滴静注 day 1-5	7日				
				シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ² ×2				点滴静注 day 3, 4	
				注射用エンドキサン	50 mg/kg				点滴静注 day 6	
				グランシリンジ	200 µg/m				点滴静注 day 1-5	
(医)MTX(10/7/7)移植後GVHD予防 [血緑HLA一致]	注射用メソトレキセート	10 mg/m	点滴静注 day 1	7日						
		7 mg/m	点滴静注 day 3, 6							
2017.1.6	16350	【初回】Alemtuzumab(3) 慢性リンパ性白血病	マブキャンバス点滴静注	3 mg/body	点滴静注 day 1	1日 (連日投与)	再発・難治性 慢性リンパ性白血病	済		
			【増量】Alemtuzumab(10) 慢性リンパ性白血病	マブキャンバス点滴静注	10 mg/body				点滴静注 day 1	1日 (連日投与)
			【増量】Alemtuzumab(30) 慢性リンパ性白血病	マブキャンバス点滴静注	30 mg/body				点滴静注 day 1, 3, 5	
2017.2.7	16351	Erd(Elotuzumab+LEN+DEX) 多発性骨髄腫[1コース目・2コース目]	エムプリシディ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫	済		
				レブラミドカプセル	25 mg/body				経口投与 day 1-21	
				レナリドミド錠	28 mg/body				経口投与 day 1, 8, 15, 22	
				デキサート注射液	8 mg/body				点滴静注 day 1, 8, 15, 22	
		Erd(Elotuzumab+LEN+DEX) 多発性骨髄腫[3コース目以降]	エムプリシディ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15				28日	
				レブラミドカプセル	25 mg/body					経口投与 day 1-21
				レナリドミド錠	28 mg/body					経口投与 day 1, 15
				40 mg/body	経口投与 day 8, 22					
		8 mg/body	点滴静注 day 1, 15							
2017.6.6	17357	Bendamustine(100) 慢性リンパ性白血病	トレアキシン点滴静注用	100 mg/m	点滴静注 day 1, 2	28日	慢性リンパ性白血病	済		
2017.6.6	17358	MTX+PSL静注	注射用メソトレキセート	15 mg/body	静注 day 1	1日	悪性リンパ腫及び白血病 中樞浸潤の治療・予防	済		
			水溶性ブレドニン	10 mg/body	静注 day 1					
		MTX+Ara-C+PSL静注	注射用メソトレキセート	15 mg/body	静注 day 1	1日				
			キロサイド注	40 mg/body	静注 day 1					
		水溶性ブレドニン	10 mg/body	静注 day 1						
2017.6.6	17360	(医)LEED(L-PAM+CPA+ETP+DEX) 自家末梢血幹細胞移植前	アルケラン静注用	130 mg/m	点滴静注 day 4	4日	自家末梢血幹細胞移植前	済		
				注射用エンドキサン	60 mg/kg				点滴静注 day 1, 2	
				エトボシド点滴静注液	300 mg/m				点滴静注 day 1, 2, 3	
				デキサート注射液	40 mg				点滴静注 day 1, 2, 3, 4	
2017.8.1	17363	FLU+BU 造血幹細胞移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/m	点滴静注 day 1-5	6日	造血幹細胞移植前治療 AML/ALL/MDS	済		
				ブスルフェクス静注用	3.2 mg/kg				点滴静注 day 3, 4	
2017.9.5	17365	[1コース目] 【静注】Kd療法 多発性骨髄腫	カイプロリス点滴静注用	20 mg/m	点滴静注 day 1, 2	28日	多発性骨髄腫 2次・3次治療、再発例	済		
				56 mg/m	点滴静注 day 8, 9, 15, 16					
				レナデックス錠	20 mg/body				経口投与 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23	
		[2コース目以降] 【静注】Kd療法 多発性骨髄腫	カイプロリス点滴静注用	56 mg/m	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16				28日	
					経口投与 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23					
				レナデックス錠	20 mg/body					経口投与 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
2017.10.24	17370	BU+CPA 造血幹細胞移植前治療	ブスルフェクス静注用	3.2 mg/kg	点滴静注 day 1-4	6日	造血幹細胞移植前治療 AML/ALL/MDS	済		
			注射用エンドキサン	60 mg/kg	点滴静注 day 5, 6					

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録				
2017.12.5	17371	[1-3コース目] Dd療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	多発性骨髄腫 2次・3次治療、再発例	済				
			ヘルケイド注射用	1.3 mg/m ²	静注または皮下注 day 1, 4, 8, 11							
			デキサート注	20 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15							
		[4-8コース目] Dd療法 多発性骨髄腫	レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 2, 4, 5, 9, 11, 12	21日						
			ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1							
			ヘルケイド注射用	1.3 mg/m ²	静注または皮下注 day 1, 4, 8, 11							
		[9コース目以降] Dd療法 多発性骨髄腫	デキサート注	20 mg/body	点滴静注 day 1	21日						
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12							
			ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15							
2017.12.5	17372	[1-2コース目] DLd療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 2次・3次治療、再発例	済				
			レブラミドカプセル	25 mg/body	経口投与 day 1-21							
			デキサート注	20 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22							
		[3-6コース目] DLd療法 多発性骨髄腫	レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 2, 9, 16, 23	28日						
			ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 15							
			レブラミドカプセル	25 mg/body	経口投与 day 1-21							
		[7コース目以降] DLd療法 多発性骨髄腫	デキサート注	20 mg/body	点滴静注 day 1	28日						
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 2							
			レナデックス錠	40 mg/body	経口投与 day 9, 23							
		2017.12.5	17373	MAC(MTX(15, 10, 10)) GVHD予防	注射用メソトレキセート	15 mg/m ²			点滴静注 day 1	7日	同種造血幹細胞移植 白血病・悪性リンパ腫・ 骨髄異形成症候群	済
					ロイコボリン注	10 mg/m ²			点滴静注 day 3, 6			
					注射用メソトレキセート	15 mg/m ²			点滴静注 day 2			
[day11あり] MAC(MTX(15, 10, 10)) GVHD予防	ロイコボリン注			10 mg/m ²	点滴静注 day 4, 7, 8	14日						
	注射用メソトレキセート			15 mg/m ²	点滴静注 day 1							
	ロイコボリン注			10 mg/m ²	点滴静注 day 3, 6, 11							
2017.12.5	17374	RIC(short MTX(10, 7, 7)) GVHD予防	注射用メソトレキセート	10 mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	同種造血幹細胞移植 白血病・悪性リンパ腫・ 骨髄異形成症候群	済				
			ロイコボリン注	10 mg/m ²	点滴静注 day 2							
			ロイコボリン注	7 mg/m ²	点滴静注 day 4, 7, 8							
		[day11あり] RIC(short MTX(10, 7, 7)) GVHD予防	注射用メソトレキセート	10 mg/m ²	点滴静注 day 1	14日						
			ロイコボリン注	10 mg/m ²	点滴静注 day 3, 6, 11							
			ロイコボリン注	7 mg/m ²	点滴静注 day 2							
2018.2.6	17378	CPA(60)+TBI 造血幹細胞移植前治療	注射用エンドキサン	60 mg/kg	点滴静注 day 1, 2	3日	造血幹細胞移植前治療	済				
			[皮下注] VRD(BOR+LEN+DEX) 多発性骨髄腫	ヘルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 4, 8, 11	21日	多発性骨髄腫	済			
				レブラミドカプセル	25 mg/body	経口投与 day 1-14						
			2018.4.3	18383	レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	21日	悪性リンパ腫 (節外性NK/T細胞リンパ腫, 鼻型)	済		
						デキサート注	40 mg/body				点滴静注 day 1, 2, 3	
			2018.4.3	18384	エトボシド点滴静注液	67 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3	21日	悪性リンパ腫 (節外性NK/T細胞リンパ腫, 鼻型)	済		
注射用イホマイド	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3										
2018.4.3	18385	カルボプラチン点滴静注液	200 mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	悪性リンパ腫 (節外性NK/T細胞リンパ腫, 鼻型)	済					
			ALL97 POMP(PSL+VCR+MTX+6-MP) ALL/LBL	オンコピン注射用				1.5 mg/m ² (最大2 mg)	点滴静注 day 1	28日	ALL/LBL	済
2018.4.3	18385	POMP(PSL+VCR+MTX+6-MP) ALL/LBL	ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-5	28日	ALL/LBL	未				
			メソトレキセート錠	20 mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22							
2018.4.3	18386	[JALSG ALL202-O] Induction (25歳以上60歳未満)	ロイケリン散	60 mg/m ²	経口投与 day 1-28	28日	ALL/LBL	済				
			オンコピン注射用	2 mg/body	点滴静注 day 1							
			ブレドニン錠	200 mg/m ²	経口投与 day 1-5							
			メソトレキセート錠	20 mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22							
			ロイケリン散	50 mg/m ²	経口投与 day 1-28							
			注射用エンドキサン	1200 mg/m ²	点滴静注 day 1							
			オンコピン注射用	1.3 mg/m ² (最大2 mg)	点滴静注 day 1, 8, 15, 22							
			ダウノマイシン静注用	60 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3							
			ロイナーゼ注用	3,000 U/m ²	点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20							
			ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-21 (day 22から漸減)							
			注射用エンドキサン	800 mg/m ²	点滴静注 day 1							
			オンコピン注射用	1.3 mg/m ² (最大2 mg)	点滴静注 day 1, 8, 15, 22							
		ダウノマイシン静注用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3								
		ロイナーゼ注用	3,000 U/m ²	点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20								
		ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 1-7 (day 8から漸減)								
		[JALSG ALL202-O] Consolidation①④ HdAra-C	シタラピン点滴静注液	2000 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3	21日	急性リンパ性白血病	済				
			エトボシド点滴静注液	100 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 3							
			デキサート注	40 mg/body	点滴静注 day 1, 2, 3							
			注射用メソトレキセート	15 mg/body	点滴静注 day 1							
			デキサート注	4 mg/body	点滴静注 day 1							
			メソトレキセート点滴静注液	3.0 g/m ²	点滴静注 day 1							
		[JALSG ALL202-O] Consolidation②⑤ HdMTX	オンコピン注射用	1.3 mg/m ² (最大2 mg)	点滴静注 day 1, 15	21日	急性リンパ性白血病	済				
			ロイケリン散	25 mg/m ²	経口投与 day 1-21							
			注射用メソトレキセート	15 mg/body	点滴静注 day 1, 15							
デキサート注	4 mg/body		点滴静注 day 1, 15									
オンコピン注射用	1.3 mg/m ² (最大2 mg)		点滴静注 day 1, 8, 15									
ドキシソルビシン塩酸塩注射用	30 mg/m ²		点滴静注 day 1, 8, 15									
[JALSG ALL202-O] Consolidation③ (reinduction)	デカドロン錠	10 mg/m ²	経口投与 day 1-8, 15-22	42日	急性リンパ性白血病	済						
	注射用エンドキサン	1000 mg/m ²	点滴静注 day 29									
	ロイケリン散	60 mg/m ²	経口投与 day 29-42									
	キロサイド注	75 mg/m ²	点滴静注 day 29-33, 36-40									
	注射用メソトレキセート	15 mg/body	点滴静注 day 29									
	キロサイド注	40 mg/body	点滴静注 day 1, 29									
	デキサート注	4 mg/body	点滴静注 day 1, 29									
	注射用メソトレキセート	15 mg/body	点滴静注 day 1, 29									
	キロサイド注	40 mg/body	点滴静注 day 1, 29									
	デキサート注	4 mg/body	点滴静注 day 1, 29									

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録	
2021.4.9		[JALSJ ALL202-O] Maintenance (25歳以上60歳未満)	オンコピン注射用	1.3 mg/mi(最大2 mg)	点滴静注 day 1	28日		済	
			ブレドニン錠	60 mg/mi	経口投与 day 1-5				
			メソトレキセート錠	20 mg/mi	経口投与 day 1, 8, 15, 22				
			ロイケリン散	60 mg/mi	経口投与 day 1-28				
2018.10.2	18396	[1]-[3]目 O-CHOP 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	悪性リンパ腫	済	
			注射用エンドキサン	750 mg/mi	点滴静注 day 2				
			ドキシソルビシン塩酸塩注射用	50 mg/mi	点滴静注 day 2				
			オンコピン注射用	1.4 mg/mi	点滴静注 day 2				
			水溶性ブレドニン注	100 mg/body	点滴静注 day 1, 2				
			ブレドニン錠	100 mg/body	経口投与 day 3-5				
	[2]-[6]-[3]目 O-CHOP 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	21日				
		注射用エンドキサン	750 mg/mi	点滴静注 day 2					
		ドキシソルビシン塩酸塩注射用	50 mg/mi	点滴静注 day 2					
		オンコピン注射用	1.4 mg/mi	点滴静注 day 2					
		水溶性ブレドニン注	100 mg/body	点滴静注 day 1, 2					
		ブレドニン錠	100 mg/body	経口投与 day 3-5					
[7]-[8]-[3]目 O-CHOP 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	21日					
2018.10.2	18397	[1]-[3]目 O-CVP 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15	21日	濾胞性リンパ腫	済	
			注射用エンドキサン	750 mg/mi	点滴静注 day 2				
			オンコピン注射用	1.4 mg/mi	点滴静注 day 2				
			水溶性ブレドニン注	100 mg/body	点滴静注 day 1, 2				
			ブレドニン錠	100 mg/body	経口投与 day 3-5				
	[2]-[8]-[3]目 O-CVP 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	21日				
		注射用エンドキサン	750 mg/mi	点滴静注 day 2					
		オンコピン注射用	1.4 mg/mi	点滴静注 day 2					
		水溶性ブレドニン注	100 mg/body	点滴静注 day 1, 2					
		ブレドニン錠	100 mg/body	経口投与 day 3-5					
2018.10.2	18398	[1]-[3]目 O(1000)+BM(90) 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	濾胞性リンパ腫	済	
			トリアキシン点滴静注用	90 mg/mi	点滴静注 day 2, 3				
		[2]-[6]-[3]目 O(1000)+BM(90) 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	28日			
			トリアキシン点滴静注用	90 mg/mi	点滴静注 day 1, 2				
2018.10.2	18399	Obinutuzumab(1000) 濾胞性リンパ腫	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	56日	濾胞性リンパ腫	済	
2018.10.2	18400	[皮下注] twice-weekly VD 多発性骨髄腫	ベルケイド注射用	1.3 mg/mi	皮下注 day 1, 4, 8, 11	21日	多発性骨髄腫	済	
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12				
2018.10.2	18401	[皮下注] weekly VD 多発性骨髄腫	ベルケイド注射用	1.3 mg/mi	皮下注 day 1, 8, 15, 22	35日	多発性骨髄腫	済	
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23				
2018.10.5	18402	FAMC-T 血縁HLA半合致移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/mi	点滴静注 day 1-6 (day -9~-4)	10日	血縁HLA半合致移植前治療 AML/ALL/MDS	済	
			シタラピン点滴静注用液	2000 mg/mi	点滴静注 day 1-4 (day -9~-6)				
			アルケラン静注用	70 mg/mi	点滴静注 day 7, 8 (day -3~-2)				
			サイモグロプリン点滴静注用	1.25 mg/kg	点滴静注 day 8, 9 (day -2~-1)				
2018.12.4	18404	Inotuzumab Ozogamicin CD22陽性急性リンパ性白血病 1コース目	ベスボンサ点滴静注用	0.8 mg/mi 0.5 mg/mi	点滴静注 day 1 点滴静注 day 8, 15	21日	再発又は難治性 CD22陽性 急性リンパ性白血病	済	
			Inotuzumab Ozogamicin CD22陽性急性リンパ性白血病 2-6コース目(寛解)	ベスボンサ点滴静注用	0.5 mg/mi				点滴静注 day 1, 8, 15
				Inotuzumab Ozogamicin CD22陽性急性リンパ性白血病 2-6コース目(非寛解)	ベスボンサ点滴静注用				0.8 mg/mi 0.5 mg/mi
2018.12.4	18405	FLU+BU4 造血幹細胞移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/mi	点滴静注 day 1-6	7日	造血幹細胞移植前治療 AML/ALL/MDS	済	
2018.12.4	18406	BV+AVD(DXR+VLB+DTIC) CD30陽性ホジキンリンパ腫	ブスルフェクス静注用	3.2 mg/kg	点滴静注 day 2-5	28日	未治療 CD30陽性 ホジキンリンパ腫	済	
			アドセトリス点滴静注用	1.2 mg/kg	点滴静注 day 1, 15				
			ドキシソルビシン塩酸塩注射用	6 mg/mi	点滴静注 day 1, 15				
			エクザール注射用	375 mg/mi	点滴静注 day 1, 15				
2018.12.4	18407	[≧45kg]Blinatumomab B-ALL 1コース目	ビーリンサイト点滴静注用	9 µg/day 28 µg/day	点滴静注 day 1-7 点滴静注 day 8-28	42日	再発又は難治性 B細胞性急性リンパ性白血病	済	
			[≧45kg]Blinatumomab B-ALL 2-5コース目	ビーリンサイト点滴静注用	28 µg/day				点滴静注 day 1-28
				[≧45kg]Blinatumomab B-ALL 6-9コース目	ビーリンサイト点滴静注用				28 µg/day
2018.12.10	(限定)	(医)FLU(30)+L-PAM(70) 造血幹細胞移植前RIC	フルダラ静注用	30 mg/mi	点滴静注 day 1-5	7日	造血幹細胞移植前治療 AML・ALL・MDS・ 悪性リンパ腫	済	
			アルケラン静注用	70 mg/mi	点滴静注 day 4,5				
2019.1.22	18413	Nelarabine(1500) 再発・難治性T-ALL/LBL	アラノンジ静注用	1500 mg/mi	点滴静注 day 1, 3, 5	21日	再発・難治性T-ALL/LBL	済	
2019.2.5	18416	ATRA(45)+ATO(0.15) 地固め療法①~③	トリセノックス注	0.15 mg/kg	点滴静注 day 1-5, 8-12, 15-19, 22-26	56日	再発・難治性 急性前骨髄球性白血病	済	
			バサノイドカプセル	45 mg/mi	経口投与 day 1-14, 29-42				
		ATRA(45)+ATO(0.15) 地固め療法④	トリセノックス注	0.15 mg/kg	点滴静注 day 1-5, 8-12, 15-19, 22-26	56日			
			バサノイドカプセル	45 mg/mi	経口投与 day 1-14				
2019.4.2	19418	FLU(30)+BU4+L-PAM(40) 造血幹細胞移植前治療	フルダラ静注用	30 mg/mi	点滴静注 day 1~6 (day -7~-2)	7日	造血幹細胞移植前治療 AML/ALL/MDS	済	
			ブスルフェクス静注用	3.2 mg/kg	点滴静注 day 1~4 (day -7~-4)				
			アルケラン静注用	40 mg/mi	点滴静注 day 5, 6 (day -3, -2)				
2019.9.24	19428	Pralatrexate(30) 再発・難治性PTCL	ジフォルタ注射液	30 mg/mi	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36	49日	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	済	
2019.9.26	19429	Nivolumab(240) 再発難治古典的ホジキンリンパ腫	オプジーボ点滴静注	240 mg/body	点滴静注 day 1	14日	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	済	
2019.10.1	19431	Mitoxantrone(10) 急性白血病	ノバントロン注	10 mg/body	点滴静注 day 1	7日	急性白血病	済	
2019.10.1	19432	Romidepsin(14) 再発・難治性PTCL	イストダックス点滴静注用	14 mg/mi	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	再発・難治性 末梢性T細胞リンパ腫	済	

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録		
2019.12.24	19434	[1]-1目/静注]Once weekly Kd療法 多発性骨髄腫	カイプロリス点滴静注用	20 mg/m	点滴静注 day 1	28日	多発性骨髄腫 2次・3次治療、再発例	済		
			カイプロリス点滴静注用	70 mg/m	点滴静注 day 8, 15					
			レナデックス錠	40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22					
		[2-9]-1目/静注]Once weekly Kd療法 多発性骨髄腫	カイプロリス点滴静注用	70 mg/m	点滴静注 day 1, 8, 15	28日				
			レナデックス錠	40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22					
			カイプロリス点滴静注用	70 mg/m	点滴静注 day 1, 8, 15					
[10]-1目以降/静注]Once weekly Kd療法 多発性骨髄腫	レナデックス錠	40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15	28日						
	カイプロリス点滴静注用	70 mg/m	点滴静注 day 1, 8, 15							
	レナデックス錠	40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15							
2019.12.24	19435	EPd(Elotuzumab+Pomalidomide+DEX) 多発性骨髄腫 1コース目・2コース目	エムブリシディ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 2次・3次治療、再発例	済		
			ボマリストカプセル	4 mg/body	経口投与 day 1-21					
			レナリミド錠	28 mg/body	経口投与 day 1, 8, 15, 22					
			デキサート注射液	8 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22					
			エムブリシディ点滴静注用	20 mg/kg	点滴静注 day 1					
			ボマリストカプセル	4 mg/body	経口投与 day 1-21					
	EPd(Elotuzumab+Pomalidomide+DEX) 多発性骨髄腫 3コース目以降	レナリミド錠	28 mg/body	経口投与 day 1	28日					
		レナリミド錠	40 mg/body	経口投与 day 8, 15, 22						
		デキサート注射液	8 mg/body	点滴静注 day 1						
		アドセトリス点滴静注用	1.8 mg/kg	点滴静注 day 1		21日		末梢性T細胞リンパ腫 1次治療、初発例	未	
		エンドキサン注	7500 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		ドキシソルピシン塩酸塩注射液	50 mg/m ²	点滴静注 day 1						
水溶性ブレドニン注	100 mg/body	点滴静注 day 1								
ブレドニン錠	100 mg/body	経口投与 day 2-5								
メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1								
2020.2.4	[JSTC ALL/MRD2019共通]ステロイドブリフェイス	デキサート注	3.3 mg	髄注 day 1	1日	済				
		注射用エンドキサン	16-35歳：1000 mg/m ² 36-55歳：1000 mg/m ² 56-65歳：500 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	点滴静注 day 1-3						
		オンコピン注射用	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15, 22						
		ロイナーゼ注用	16-35歳：6000 U/m ² 36-55歳：3000 U/m ² 56-65歳：3000 U/m ²	点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20						
		ブレドニン錠	60 mg/m ² (max 100 mg/body)	経口投与 day 1-21 (day 22~ tapering)						
		ソル・コーテフ注	56-65歳のみ：100 mg	点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20						
		2020.7.20	[JSTC Ph ALL/MRD2019 16-55歳]P/D-B1 地固め療法①	メソトレキセート注			15 mg	髄注 day 1	14日	済
				デキサート注			3.3 mg	髄注 day 1		
				キロサイド注			2000 mg/m ²	点滴静注 day 1-4		
				アイクルシグ錠			30-45 mg/day	経口投与 day 1-14		
				スプリセル錠			100 mg/day	経口投与 day 1-14		
メソトレキセート注	15 mg			髄注 day 1						
[JSTC Ph ALL/MRD2019 16-55歳]P/D-B2 地固め療法④	デキサート注	3.3 mg	髄注 day 1	14日	済					
	キロサイド注	2000 mg/m ²	点滴静注 day 1-4							
	アイクルシグ錠	30-45 mg/day	経口投与 day 1-14							
	スプリセル錠	100 mg/day	経口投与 day 1-14							
	メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1, 15			28日	済			
	デキサート注	3.3 mg	髄注 day 1, 15							
オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 15								
メソトレキセート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15								
メソトレキセート注	1800 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15								
アイクルシグ錠	30-45 mg/day	経口投与 day 1-28								
2020.8.4	[JSTC Ph ALL/MRD2019 16-55歳]P/D-C1 地固め療法②	スプリセル錠	100 mg/day	経口投与 day 1-28	28日	済				
		メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1, 15						
		デキサート注	3.3 mg	髄注 day 1, 15						
		オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 15						
		メソトレキセート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15						
		メソトレキセート注	1800 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15						
	[JSTC Ph ALL/MRD2019 16-55歳]P/D-C2 地固め療法⑤	アイクルシグ錠	30-45 mg/day	経口投与 day 1-28	28日	済				
		スプリセル錠	100 mg/day	経口投与 day 1-28						
		メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1, 15						
		デキサート注	3.3 mg	髄注 day 1, 15						
		オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 15						
		メソトレキセート注	200 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15						
19442	[JSTC Ph ALL/MRD2019 16-55歳]P/D-D 地固め療法③	メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1	28日	急性リンパ性白血病	済			
		デキサート注	3.3 mg	髄注 day 1						
		エンドキサン注	1000 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	点滴静注 day 1						
		オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1						
		ブレドニン錠	60 mg/m ² (max 100 mg/body)	経口投与 day 1-7 (day 8~tapered)						
		アイクルシグ錠	30-45 mg/day	経口投与 day 1-28						
		スプリセル錠	100 mg/day	経口投与 day 1-28						

造血器腫瘍 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録	
2022.12.27		[JSC Ph ALL/MRD2019 16-55歳]P/D-M 維持療法	オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1	28日			
			ブレドニン錠	60 mg/m ² (max 100 mg/body)	経口投与 day 1-5				
			アイクルシグ錠	30-45 mg/day	経口投与 day 1-28				
			スプリセル錠	100 mg/day	経口投与 day 1-28				
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳]地固め療法(B-1,B-2) Ara-C大量療法		メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1	6日		
				ソル・メドロール注	3.3 mg				
				ノバントロン注	7 mg/m ²	点滴静注 day 2, 3			
				シタラピン点滴静注	1.5 g/m ²	点滴静注 day 1-4			
				ロイナーゼ注	6000 U/m ²	点滴静注 day 5			
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳]地固め療法(C-1,C-2) CNS予防		メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 1, 15	28日		
				デキサート注	3.3 mg				
				オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 15			
				メソトレキセート注	150 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15			
				メソトレキセート注	1350 mg/m ²	点滴静注 day 1, 15			
				ロイナーゼ注	6000 U/m ²	点滴静注 day 2, 16			
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳]地固め療法(A-2)		エンドキサン注	500 mg/m ²	点滴静注 day 1	22日		
				ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
				オンコピン注	1.3 mg/m ² (max 2 mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15, 22			
				ロイナーゼ注	6000 U/m ²	点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20			
				ブレドニン錠	60 mg/m ² (max 100 mg/body)	経口投与 day 1-7 (day 8~tapered)			
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳] Blinatumomab(≦45kg) 1サイクル目		メソトレキセート注	15 mg	髄注 day -1	42日		
				デキサート注	3.3 mg				
				ビーリンサイト点滴静注用	5 µg/m ² 15 µg/m ²	点滴静注 day 1-7 点滴静注 day 8-28			
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳] Blinatumomab(≦45kg) 2, 4サイクル目		メソトレキセート注	15 mg	髄注 day 29	42日		
				デキサート注	3.3 mg				
				ビーリンサイト点滴静注用	15 µg/m ²	点滴静注 day 1-28			
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳] Blinatumomab(≦45kg) 2, 4サイクル目		ビーリンサイト点滴静注用	15 µg/m ²	点滴静注 day 1-28	42日		
2023.6.6		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳]維持療法(M-1)	ロイケリン散	30mg/m ²	経口投与 day 1-28	28日			
			メソトレキセート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1, 8, 15, 22				
			オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)	点滴静注 day 1				
			ロイナーゼ注	6000U/m ²	筋注 day 1				
		[JSC nonPh ALL/MRD2019 56-65歳]維持療法(M-2)	ロイケリン散	30mg/m ²	経口投与 day 1-7	7日			
			メソトレキセート錠	20mg/m ²	経口投与 day 1				
2020.6.2	20455	[RI標識抗体療法] Rituximab(250) 悪性リンパ腫	リツキシタン点滴静注用	250 mg/m ²	点滴静注 day 1	7日	悪性リンパ腫	済	
2020.6.2	20456	THIO+BU4 造血幹細胞移植前治療	リサイオ点滴静注用	3.2 mg/kg	点滴静注 day 1-4	8日	悪性リンパ腫	済	
			ブスルフェクス点滴静注用	5 mg/kg	点滴静注 day 5, 6				
2020.8.13	20462	Pembrolizumab(200) 再発難治古典的ホジキンリンパ腫	キイトルーダ点滴静注	200 mg/body	点滴静注 day 1	21日	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	済	
2020.9.2	20464	[1コース目] IsaPd療法 多発性骨髄腫	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 再発又は難治性	削除	
			ボマリストカプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21				
			デキサート注射液	20-40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22				
		[2コース目以降] IsaPd療法 多発性骨髄腫	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日			
			ボマリストカプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21				
			デカドロン錠	20-40 mg/body	経口投与 day 8, 22				
デキサート注射液	20-40 mg/body	点滴静注 day 1, 15							
2020.9.17	20473	[6週]Pembrolizumab(400) 再発難治古典的ホジキンリンパ腫	キイトルーダ点滴静注	400 mg/body	点滴静注 day 1	42日	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	済	
2020.10.6	20476	[1コース目/皮下注] D-VMP療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日	多発性骨髄腫 造血幹細胞移植非適応の1次治療	済	
			ヘルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32				
			アルケラン錠	9 mg/m ²	経口投与 day 1-4				
			ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 2-4				
		[2-9コース目/皮下注] D-VMP療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 22	42日			
			ヘルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 8, 22, 29				
			アルケラン錠	9 mg/m ²	経口投与 day 1-4				
			ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 2-4				

造血器腫瘍 院内登録レジメナー覧

承認日	レジメナー番号	レジメナー名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録		
		[10コース目以降/皮下注] D-VMP療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1	28日				
2020.10.7	20482	[4週]Nivolumab(480) 再発難治古典的ホジキンリンパ腫	オプジーボ点滴静注	480 mg/body	点滴静注 day 1	28日	再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫	済		
2021.2.4	20509	[1コース目] DKd療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	8 mg/kg	点滴静注 day 1, 2	28日	多発性骨髄腫	済		
				16 mg/kg	点滴静注 day 8, 15, 22					
			カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2					
				56 mg/m ²	点滴静注 day 8, 9, 15, 16					
				デキサート注射液	20 mg/body	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16				
					40 mg/body	点滴静注 day 22				
		[2コース目] DKd療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日				
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16					
			デキサート注射液	20 mg/body	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16					
				40 mg/body	点滴静注 day 22					
		[3-6コース目] DKd療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日				
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16					
デキサート注射液	20 mg/body		点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16							
		40 mg/body	点滴静注 day 22							
[7コース目以降] DKd療法 多発性骨髄腫	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1	28日						
	カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16							
	デキサート注射液	20 mg/body	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16							
		40 mg/body	点滴静注 day 22							
2021.2.15	限定	(限)PTCY 血縁HLA半合致移植GVHD予防	注射用エンドキサン	40 mg/kg	点滴静注 day 1, 2	4日	AML, MDS等	済		
2021.5.19	21517	[1コース目]Pola(1.8)+R(375)+BM(90) DLBCL	ボライビー点滴静注	1.8 mg/kg	点滴静注 day 2	21日	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	済		
			リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			トリアキシシン点滴静注	90 mg/m ²	点滴静注 day2, 3					
		[2-6コース目]Pola(1.8)+R(375)+BM(90) DLBCL	ボライビー点滴静注	1.8 mg/kg	点滴静注 day 2	21日				
			リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²	点滴静注 day 1					
			トリアキシシン点滴静注	90 mg/m ²	点滴静注 day1, 2					

造血器腫瘍 院内登録レジメナー覧

承認日	レジメナー番号	レジメナー名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録				
2021.6.24	21525	[1コース目/皮下注] Drq-VMP療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 8, 15, 22, 29, 36	42日	多発性骨髄腫 造血幹細胞移植非適応の1次治療	済				
			ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32							
			アルケラン錠	9 mg/m ²	経口投与 day 1-4							
			ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 2-4							
		[2-9コース目/皮下注] Drq-VMP療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 22	42日						
			ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 8, 22, 29							
			アルケラン錠	9 mg/m ²	経口投与 day 1-4							
			ブレドニン錠	60 mg/m ²	経口投与 day 2-4							
		[10コース目以降/皮下注] Drq-VMP療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1	28日						
		2021.6.24	21526	VEN+LDAC(20) 急性骨髄性白血病	バネクレクスタ錠	10-600 mg/body			経口投与 day 1-28	28日	急性骨髄性白血病	済
					キロサイド注	20 mg/m ²			点滴静注(or皮下注射) day 1-10			
		2021.7.16	20528	[1コース目/皮下注] DrqKd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body			皮下注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫	済
カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ² 56 mg/m ²				点滴静注 day 1, 2 点滴静注 day 8, 9, 15, 16							
デキサート注射液	20 mg/body				点滴静注 day 1, 2, 9, 16							
レナデックス錠	20 mg/body 40 mg/body				経口投与 day 8, 15 経口投与 day 22							
[2コース目/皮下注] DrqKd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注			15 mL/body	皮下注 day 1, 8, 15, 22	28日						
	カイプロリス点滴静注用			56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16							
	デキサート注射液			20 mg/body	点滴静注 day 2, 9, 16							
	レナデックス錠			20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 8, 15 経口投与 day 22							
[3-6コース目/皮下注] DrqKd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注			15 mL/body	点滴静注 day 1, 15	28日						
	カイプロリス点滴静注用			56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16							
	デキサート注射液			20 mg/body	点滴静注 day 2, 8, 9, 16							
	レナデックス錠			20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 15 経口投与 day 22							
[7コース目以降/皮下注] DrqKd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注			15 mL/body	点滴静注 day 1	28日						
	カイプロリス点滴静注用			56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16							
	デキサート注射液			20 mg/body	点滴静注 day 2, 8, 9, 15, 16							
	レナデックス錠			20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1 経口投与 day 22							
2021.7.16	20529	[1-3コース目/皮下注] DrqVd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 8, 15	21日	多発性骨髄腫	済				
			ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 4, 8, 11							
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15							
		[4-8コース目/皮下注] DrqVd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1	21日						
			ベルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 4, 8, 11							
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12							
		[9コース目以降/皮下注] DrqVd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー-口皮下注	15 mL/body	点滴静注 day 1	28日						
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1							
		2021.7.27	限定	(限)Special C(VLB+PSL+MTX+6-MP)療法 ランゲルハンス細胞組織球症	エクザール注	6 mg/m ² (Max 6 mg/body) 2mg/kg			点滴静注 day 1	28日	ランゲルハンス細胞組織球症	済
					ブレドニン錠	(Max 60mg/day)			経口投与 day 1-5			
					メソトレキセート注	20 mg/m ²			経口投与 day 15			
					ロイケリン散	1.5 mg/kg			経口投与 day 1-28			

造血器腫瘍 院内登録レジメン一覧

承認日	レジメン番号	レジメン名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2021.9.15	21534	[1-2コース目] DrqLd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫	済
			レブラミドカプセル	25 mg/body	経口投与 day 1-21			
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23			
		[3-6コース目] DrqLd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 15	28日		
			レブラミドカプセル	25 mg/body	経口投与 day 1-21			
			レナデックス錠	20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 2, 15, 16 経口投与 day 8, 22			
		[7コース目以降] DrqLd療法 多発性骨髄腫	ダラキュー口皮下注	15 mL/body	点滴静注 day 1	28日		
			レブラミドカプセル	25 mg/body	経口投与 day 1-21			
			レナデックス錠	20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 2 経口投与 day 8, 15, 22			
2021.9.30	21538	(研)[1コース目]/JCOG2008]O(1000)+BM(90) 未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫 導入療法	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15	28日	未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫	済
			トリアキシン点滴静注	90 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
		(研)[2-6コース目]/JCOG2008]O(1000)+BM(90) 未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫 導入療法	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	28日		
			トリアキシン点滴静注	90 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2			
		(研)[JCOG2008]Obinutuzumab(1000) 未治療高腫瘍量濾胞性リンパ腫 維持療法	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	56日		
		2021.10.5	21539	[1コース目]R ² 療法 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/m ²		
レブラミドカプセル	20 mg/body				経口投与 day 1-21			
[2-5コース目]R ² 療法 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	リツキシマブBS点滴静注			375 mg/m ²	点滴静注 day 1	28日		
	レブラミドカプセル			20 mg/body	経口投与 day 1-21			
[6-12コース目]R ² 療法 濾胞性リンパ腫・辺縁帯リンパ腫	レブラミドカプセル			20 mg/body	経口投与 day 1-21	28日		
2021.10.6	21545			CPA(50)+ATG(2.5) 造血幹細胞移植前治療	注射用エンドキサン	50 mg/kg	点滴静注 day 1-4 (day -5~-2)	5日
		サイモグロブリン点滴静注用	2.5 mg/kg		点滴静注 day 1, 2 (day -5~-4)			
2021.12.7	21551	[リンパ球除去化学療法] CPA(500)+FLU(30) B-ALL	注射用エンドキサン	500 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	5日	CD19陽性のB細胞性急性リンパ芽球性白血病 (キムリア点滴静注投与の前処置)	済
			フルダラ静注用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1-4			
		[リンパ球除去化学療法] Ara-C(500)+ETP(150) B-ALL	キロサイド注	500 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	4日		
			エトポシド点滴静注液	150 mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
2021.12.7	21552	[リンパ球除去化学療法] CPA(250)+FLU(25) DLBCL	注射用エンドキサン	250 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	4日	再発又は難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫 (キムリア点滴静注投与の前処置)	済
			フルダラ静注用	25 mg/m ²	点滴静注 day 1-3			
		[リンパ球除去化学療法] Bendamustine(90) DLBCL	トリアキシン点滴静注	90 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2	3日		
2021.12.7	21554	(研)[JCOG1911] 維持療法B群 D-V療法	ダラザレックス点滴静注用	16 mg/kg	点滴静注 day 1	28日	多発性骨髄腫	済
			バルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 15			
		(研)[JCOG1911] 維持療法B群 Drq-V療法	ダラキュー口皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1	28日		
			バルケイド注射用	1.3 mg/m ²	皮下注 day 1, 15			
2021.12.7	21555	(研)[JSCT APL2021] 寛解導入療法	トリセノックス注	0.15 mg/m ²	点滴静注 最長60日	60日	急性前骨髄球性白血病	済
			ベサノイドカプセル	45 mg/m ²	経口投与 day 1- 血液学的寛解まで			
			プレドニン錠	0.5 mg/kg	経口投与 day 1-14 (day15以降、漸減中止)			
			イダマイシン	12 mg/m ²	点滴静注 day 2, 4, 6, 8 (高リスク群のみ)			
		(研)[JSCT APL2021] 髄注療法 (高リスク群)	注射用メソトレキセート	15 mg/body	髄注 day 1	2日		
			キロサイド注	20 mg/body				
			デキサート注射液	3.3 mg/body				
		(研)[JSCT APL2021] 地固め療法①~③	トリセノックス注	0.15 mg/m ²	点滴静注 day 1-5, 8-12, 15-19, 22-26	56日		
			ベサノイドカプセル	45 mg/m ²	経口投与 day 1-14, 29-42			
		(研)[JSCT APL2021] 地固め療法④	トリセノックス注	0.15 mg/m ²	点滴静注 day 1-5, 8-12, 15-19, 22-26	56日		
ベサノイドカプセル	45 mg/m ²		経口投与 day 1-14					
2022.1.21	21563	[1コース目] Isad療法 多発性骨髄腫	サークリサ点滴静注用	20 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 再発又は難治性	済
			デキサート注射液	20-40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22			
		[2コース目以降] Isad療法 多発性骨髄腫	サークリサ点滴静注用	20 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日		
			デカドロン錠	20-40 mg/body	経口投与 day 8, 22			
			デキサート注射液	20-40 mg/body	点滴静注 day 1, 15			

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録				
2022.1.21	21564	[1-2コース目/皮下注]DCyBorD療法 全身性ALアミロイドーシス	ダラキューロ皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 8, 15, 22	28日	全身性ALアミロイドーシス	済				
			エンドキサン錠	300 mg/m (max 500 mg)	経口投与 day 1, 8, 15, 22							
			ヘルケイド注射用	1.3mg/ml	皮下注 day 1, 8, 15, 22							
			デカドロン錠	20 mg/body	経口投与 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23							
		[3-6コース目/皮下注]DCyBorD療法 全身性ALアミロイドーシス	ダラキューロ皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 15	28日						
			エンドキサン錠	300 mg/m (max 500 mg)	経口投与 day 1, 8, 15, 22							
			ヘルケイド注射用	1.3 mg/ml	皮下注 day 1, 8, 15, 22							
			デカドロン錠	20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 2, 15, 16 経口投与 day 8, 22							
		[7-24コース目/皮下注]DCyBorD療法 全身性ALアミロイドーシス	ダラキューロ皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1	28日						
2022.2.1	21565	[1-2コース目]DrqPd療法 多発性骨髄腫	ダラキューロ皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫	済				
			ボマリстокアプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21							
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23							
		[3-6コース目]DrqPd療法 多発性骨髄腫	ダラキューロ皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1, 15	28日						
			ボマリстокアプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21							
			レナデックス錠	20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 2, 15, 16 経口投与 day 8, 22							
		[7コース目]DrqPd療法 多発性骨髄腫	ダラキューロ皮下注	15 mL/body	皮下注 day 1	28日						
			ボマリстокアプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21							
			レナデックス錠	20 mg/body 40 mg/body	経口投与 day 1, 2 経口投与 day 8, 15, 22							
		2022.4.5	22570	【皮下注】PAD療法 多発性骨髄腫	ヘルケイド注射用	1.3 mg/ml			皮下注 day 1, 4, 8, 11	28日	多発性骨髄腫 (一次治療)	済
					ドキシソルピシン塩酸塩注	9 mg/ml			点滴静注 day 1-4			
					レナデックス錠	40 mg/body			経口投与 day 1-4, 9-12, 17-20			
2022.4.5	22576	(医)ETP(50) 血球貪食症候群	エトボシド点滴静注液	50 mg/ml	点滴静注 day 1	2日	血球貪食症候群	済				
	22577	(医)ETP(150) 血球貪食症候群	エトボシド点滴静注液	150 mg/ml	点滴静注 day 1, 4 (1-2コース) 点滴静注 day 1 (3-8コース)	7日	血球貪食症候群	済				
2022.8.2	22590	FLAG療法 再発・難治性急性骨髄性白血病	フルダラ静注用	30 mg/ml	点滴静注 day 1-5	21日	再発・難治性急性骨髄性白血病	済				
			シタラビン点滴静注	2 g/ml	点滴静注 day 1-5							
			フィルグラスチムBS注	300 µg/ml	皮下注又は点滴静注 day 0-5							
	22591	FLAG-IDA療法 再発・難治性急性骨髄性白血病	フルダラ静注用	30 mg/ml	点滴静注 day 1-5	21日	再発・難治性急性骨髄性白血病	済				
			シタラビン点滴静注	2 g/ml	点滴静注 day 1-5							
			イダマイシン静注用	10 mg/ml	点滴静注 day 1-3							
			フィルグラスチムBS注	300 µg/ml	皮下注又は点滴静注 day 0-5							
	2022.9.13	22593	Pola-R-CHP療法 DLBCL	ボライビー点滴静注	1.8 mg/kg	点滴静注 day 2	21日	未治療のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	済			
リツキシマブBS点滴静注				375 mg/ml	点滴静注 day 1							
エンドキサン注				750 mg/ml	点滴静注 day 2							
ドキシソルピシン塩酸塩注				50 mg/ml	点滴静注 day 2							
ブレドニン錠				100 mg/body	経口投与 day 2-5							
2022.10.4	限定	(限)VTD-PACE療法 多発性骨髄腫	ホルテゾミブ注	1 mg/ml	皮下注 day 1, 4, 8, 11	28日	再発又は難治性の多発性骨髄腫	済				
			サレドカプセル	200 mg/body 50 mg/body	経口投与 day 1-4 経口投与 day 5-28							
			レナデックス錠	40 mg/body	経口投与 day 1-4							
			シスプラチン点滴静注	10 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
			エンドキサン注	400 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
			ドキシソルピシン塩酸塩注	10 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
			エトボシド点滴静注液	40 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
2022.10.4	限定	(限)DCEP療法 多発性骨髄腫	デキサート注	40 mg/body	点滴静注 day 1-4	28日	再発又は難治性の多発性骨髄腫	済				
			シスプラチン点滴静注	15 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
			エンドキサン注	400 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
			エトボシド点滴静注液	40 mg/ml	点滴静注 day 1-4							
2023.3.15	22611	VR-CAP マントル細胞リンパ腫	リツキシマブBS点滴静注	375 mg/ml	点滴静注 day 1	21日	マントル細胞リンパ腫	済				
			注射用エンドキサン	750 mg/ml	点滴静注 day 2							
			ドキシソルピシン塩酸塩注射用	50 mg/ml	点滴静注 day 2							
			ヘルケイド注射用	1.3 mg/ml	皮下注 day 2, 5, 9, 12							
			水溶性ブレドニン注	100 mg/body	点滴静注 day 2							
			ブレドニン錠	100 mg/body	経口投与 day 3-6							
2023.4.27	23623	Darinaparsin(300) 再発・難治性PTCL	ダルピア点滴静注	300 mg/ml	点滴静注 day 1-5	21日	再発または難治性の末梢性T細胞性リンパ腫	済				

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録
2023.6.6	23632	[1]-[3]目 Obinutuzumab(1000)+Acalabrutinib(200) CLL/SLL	ガザイバ点滴静注	100 mg/body 900 mg/body 1000 mg/body	点滴静注 day 1 点滴静注 day 2 点滴静注 day 8-15	28日	CD20陽性の慢性リンパ性白血病 (小リン) (球形リンパ腫を含む)	済
			カルケンスカプセル	200 mg/body	点滴静注 day 1-28			
		[2]-[6]-[3]目 Obinutuzumab(1000)+Acalabrutinib(200) CLL/SLL	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	点滴静注 day 1	28日		
			カルケンスカプセル	200 mg/body	点滴静注 day 1-28			
2023.7.13	限定	(限)PTCY(MAC) 血縁HLA半合致移植GVHD予防	注射用エンドキサン	50 mg/kg	点滴静注 day 1, 2	4日	AML, MDS等	済
2023.7.18	23624	FLU(30)+TBI 造血幹細胞移植前治療	注射用エンドキサン	30 mg/kg	点滴静注 day 1-3	4日	造血幹細胞移植前治療	済
2023.7.18	23625	(研)[JSCT ALL/MRD2023]P/PSL prephase	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	1日	急性リンパ性白血病	済
			デキサート注	3.3mg				
		(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023]A 寛解導入療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	28日		
			デキサート注	3.3mg				
			プレドニン錠	60mg/m (max 100mg/body)	経口投与 day 1-14 (day 15~tapered)			
			スプリセル錠	140mg/day	経口投与 day 1-28			
		(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023 56-65歳]P/D-B1 地固め療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	14日		
			デキサート注	3.3mg				
			シタラビン点滴静注	1500mg/m ²	点滴静注 day 1-4			
			アイクルシグ錠	30mg/day	経口投与 day 1-14			
		(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023 56-65歳]P/D-B2 地固め療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	14日		
			デキサート注	3.3mg				
			シタラビン点滴静注	1500mg/m ²	点滴静注 day 1-4			
			アイクルシグ錠	15-30mg/day	経口投与 day 1-14			
		(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023 56-65歳]P/D-C1 地固め療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1, 15	28日		
			デキサート注	3.3mg				
			オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)	点滴静注 day 1, 15			
			メソトレキセート注	1000mg/m ²	点滴静注 day 1, 15			
		(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023 56-65歳]P/D-C2 地固め療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1, 15	28日		
			デキサート注	3.3mg				
			オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)	点滴静注 day 1, 15			
			メソトレキセート注	1000mg/m ²	点滴静注 day 1, 15			
		(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023 56-65歳]D-E1,E2 地固め療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	28日		
			デキサート注	3.3mg				
エンドキサン注	500mg/m ²		点滴静注 day 1					
ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²		点滴静注 day 1					
オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)		点滴静注 day 1					
プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)		経口投与 day 1-7 (day 8~tapered)					
(研)[JSCT Ph ALL/MRD2023]P/D-M1 維持療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	28日				
	デキサート注	3.3mg						
	オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)	点滴静注 day 1					
	プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)	経口投与 day 1-5					
	アイクルシグ錠	15-30mg/day	経口投与 day 1-28					
	スプリセル錠	100mg/day	経口投与 day 1-28					
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2023 CD19±56-65歳]寛解導入療法(A-1)	注射用エンドキサン	500mg/m ²	点滴静注 day 1	28日				
	ダウノマイシン静注用	50mg/m ²	点滴静注 day 1-3					
	オンコピン注射用	1.3mg/m ² (max 2mg/body)	点滴静注 day 1, 8, 15, 22					
	ロイナーゼ注用	3000U/m ²	点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20					
	プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)	経口投与 day 1-8 (day 9~tapering)					
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2023 CD19±56-65歳]地固め療法(B-1) Ara-C大量療法	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1	6日				
	デキサート注	3.3mg						
	ノバントロン注	7mg/m ²	点滴静注 day 2, 3					
	シタラビン点滴静注	1.5g/m ²	点滴静注 day 1-4					
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2023 CD19±56-65歳]地固め療法(C-1) CNS予防	メソトレキセート注	15mg	髄注 day 1, 15	28日				
	デキサート注	3.3mg						
	オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)	点滴静注 day 1, 15					
	メソトレキセート注	1000mg/m ²	点滴静注 day 1, 15					
	ロイナーゼ注	6000U/m ²	点滴静注 day 2, 16					

造血器腫瘍 院内登録レジメ一覧

承認日	レジメ番号	レジメ名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録			
2023.8.1	(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2023 CD19+56-65歳]寛解導入療法(A-2)		メソトレキセート注	15mg	脚注 day 1	28日					
			デキサート注	3.3mg							
			エンドキサン注	500mg/m ²					点滴静注 day 1		
			ダウノマイシン静注用	50 mg/m ²					点滴静注 day 1-3		
			オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)					点滴静注 day 1, 8, 15, 22		
			ロイナーゼ注	3000U/m ²					点滴静注 day 9, 11, 13, 16, 18, 20		
			プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)					経口投与 day 1-8 (day 9~tapering)		
	(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2023 CD19- 56-65歳]地固め療法(B-2) Ara-C大量療法			メソトレキセート注	15mg	脚注 day 1	6日				
				デキサート注	3.3mg						
				ノバントロン注	7mg/m ²	点滴静注 day 2, 3					
				シタラピン点滴静注	1.5g/m ²	点滴静注 day 1-4					
				ロイナーゼ注	6000U/m ²	点滴静注 day 5					
	(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2023 CD19- 56-65歳]地固め療法(C-2) CNS予防			メソトレキセート注	15mg	脚注 day 1, 15	28日				
				デキサート注	3.3mg						
				オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)					点滴静注 day 1, 15	
				メソトレキセート注	1000mg/m ²					点滴静注 day 1, 15	
				ロイナーゼ注	6000U/m ²					点滴静注 day 2, 16	
	(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2019 CD19- 56-65歳]維持療法(M-1)			メソトレキセート注	15mg	脚注 day -7~各コース開始日までに行	28日				
				デキサート注	3.3mg						
				ロイケリン散	30mg/m ²					経口投与 day 1-28	
				メソトレキセート錠	20mg/m ²					経口投与 day 1, 8, 15, 22	
				オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)					点滴静注 day 1	
				ロイナーゼ注	6000U/m ²					筋注 day 1	
				プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)					点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5	
	(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2019 CD19- 56-65歳]維持療法(M-2)			ロイケリン散	30mg/m ²	経口投与 day 1-28	28日				
				メソトレキセート錠	20mg/m ²					経口投与 day 1, 8, 15, 22	
				オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)					点滴静注 day 1	
ロイナーゼ注				6000U/m ²	筋注 day 1						
プレドニン錠				60mg/m ² (max 100mg/body)	点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5						
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2019 CD19- 56-65歳]維持療法(M-3)			ロイケリン散	30mg/m ²	経口投与 day 1-28	28日					
			メソトレキセート錠	20mg/m ²					経口投与 day 1, 8, 15, 22		
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2019 CD19+ 56-65歳]維持療法(M-1)			メソトレキセート注	15mg	脚注 day -7~各コース開始日までに行	28日					
			デキサート注	3.3mg							
			ロイケリン散	30mg/m ²					経口投与 day 1-28		
			メソトレキセート錠	20mg/m ²					経口投与 day 1, 8, 15, 22		
			オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)					点滴静注 day 1		
			ロイナーゼ注	6000U/m ²					筋注 day 1		
			プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)					点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5		
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2019 CD19+ 56-65歳]維持療法(M-2)			ロイケリン散	30mg/m ²	経口投与 day 1-28	28日					
			メソトレキセート錠	20mg/m ²					経口投与 day 1, 8, 15, 22		
			オンコピン注	1.3mg/m ² (max 2mg/body)					点滴静注 day 1		
			ロイナーゼ注	6000U/m ²					筋注 day 1		
			プレドニン錠	60mg/m ² (max 100mg/body)					点滴静注 day 1 経口投与 day 2-5		
(研)[JSCT nonPh ALL/MRD2019 CD19+ 56-65歳]維持療法(M-3)			ロイケリン散	30mg/m ²	経口投与 day 1-28	28日					
			メソトレキセート錠	20mg/m ²					経口投与 day 1, 8, 15, 22		
2023.8.17	23637	[1コース目] IsaKd療法 多発性骨髄腫	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 再発又は難治性				
			カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ²					点滴静注 day 1, 2		
			デキサート注射液	56 mg/m ²					点滴静注 day 8, 9, 15, 16		
				20 mg/body					点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22		
			レナデックス錠	20 mg/body					経口投与 day 23		
		[2コース目以降] IsaKd療法 多発性骨髄腫			サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日			
					カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²					点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16
					デキサート注射液	20 mg/body					点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16
						20 mg/body					点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16
					レナデックス錠	20 mg/body					経口投与 day 22, 23
		2023.8.17	23638	[1コース目] Rituximab(375)+Venetoclax(400) CLL/SLL	リツキサン点滴静注	375mg/m ²	点滴静注 day 1	28日	CLL/SLL 再発又は難治性	済	
					ベネクレクスタ錠	400 mg/body					経口投与 day 1-28
				[2コース目以降] Rituximab(500)+Venetoclax(400) CLL/SLL	リツキサン点滴静注	500mg/m ²	点滴静注 day 1	28日			
					ベネクレクスタ錠	400 mg/body					経口投与 day 1-28

造血器腫瘍 院内登録レジメナー覧

承認日	レジメナー番号	レジメナー名	抗癌剤	用量	用法	1クール	適応	登録	
2023.11.22	23644	[1]-3目]Epcoritamab 再発・難治性LBCL/FL	エプキンリ皮下注	0.16mg/body 0.8mg/body 48mg/body	皮下注 day 1 皮下注 day 8 皮下注 day 15, 22	28日	再発・難治性の大細胞型B細胞リンパ腫 再発・難治性の濾胞性リンパ腫	済	
		[2]-3目]Epcoritamab 再発・難治性LBCL/FL	エプキンリ皮下注	48mg/body	皮下注 day 1, 8, 15, 22	28日			
		[4]-9目]Epcoritamab 再発・難治性LBCL/FL	エプキンリ皮下注	48mg/body	皮下注 day 1, 15	28日			
		[10]-1目以降]Epcoritamab 再発・難治性LBCL/FL	エプキンリ皮下注	48mg/body	皮下注 day 1	28日			
2023.12.5	23656	[寛解導入]Quizarutinib+IDR(12)+Ara-C(100)	イタマイシン静注用 キロサイド注	12mg/m ² 100mg/m ²	点滴静注 day 1-3 点滴静注 day 1-7	28日	未治療のFLT3-ITD変異陽性急性骨髄性白血病	済	
		FLT3-ITD変異陽性AML	ヴァンフリタ錠	35.4mg/body	経口投与 day 8-21				28日
		[地固め]Quizarutinib+Ara-C FLT3-ITD変異陽性AML	シタラピン注 ヴァンフリタ錠	3000mg/m ² ×2 35.4mg/body	点滴静注 day 1, 3, 5 経口投与 day 6-19	28日			
		2023.12.5	23657	Cladribine(0.09) ヘアリーセル白血病	ロイスタチン注	0.09mg/kg			点滴静注 day 1-7
2023.12.5	23658	VEN+AZA 急性骨髄性白血病	ベネクレクスタ錠 ピダーザ注	100-400 mg/body 75mg/m ²	経口投与 day 1-28 点滴静注 or 皮下注 day 1-7	28日	急性骨髄性白血病	済	
2024.1.4	23661	(研)[JCOG2201]Pola-R-CHP DLBCL	ボライビー点滴静注	1.8mg/kg	点滴静注 day 2	21日	未治療中枢神経系再発高リスクびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	済	
			リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴静注 day 1				
			エンドキサン注	750mg/m ²	点滴静注 day 2				
			ドキシソリン塩酸塩注	50mg/m ²	点滴静注 day 2				
(研)[JCOG2201]MTX+Ara-C+PSL髄腔内投与	メソトレキセート注	15mg/body	髄注 day 1	1日	未治療中枢神経系再発高リスクびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	済			
	キロサイド注	40mg/body							
	水溶性プレドニン注	10mg/body							
(研)[JCOG2201]R-HDMTX DLBCL 試験治療群(B群)	リツキシマブBS点滴静注	375mg/m ²	点滴静注 day 1	14日	未治療中枢神経系再発高リスクびまん性大細胞型B細胞リンパ腫	済			
	メソトレキセート注	3.5g/m ²	点滴静注 day 2						
2024.1.29	23662	増量BEACOPP 古典的ホジキンリンパ腫	エンドキサン注	1250mg/m ²	点滴静注 day 1	21日	古典的ホジキンリンパ腫	済	
			ドキシソリン塩酸塩注	35mg/m ²	点滴静注 day 1				
			エトボシド点滴静注液	200mg/m ²	点滴静注 day 1-3				
			プレオ注	10mg/m ² (max 15mg/body)	点滴静注 day 8				
			オンコピン注	1.4mg/m ² (max 2.0mg/body)	点滴静注 day 8				
			塩酸プロカルバジンカプセル	100mg/m ²	経口投与 day 1-7				
			プレドニン錠	40mg/m ²	経口投与 day 1-14				
2024.5.28	24664	[1]-3目]Elranatamab 再発・難治性多発性骨髄腫	エルレフィオ皮下注	12mg/body 32mg/body	皮下注 day 1 皮下注 day 4	7日	再発・難治性多発性骨髄腫	済	
			[2]-3目]Elranatamab 再発・難治性多発性骨髄腫	エルレフィオ皮下注	76mg/body				皮下注 day 1
			[3-24]-3目]Elranatamab 再発・難治性多発性骨髄腫	エルレフィオ皮下注	76mg/body				皮下注 day 1
			[25]-1目以降]Elranatamab 再発・難治性多発性骨髄腫	エルレフィオ皮下注	76mg/body				皮下注 day 1
2024.7.9	24668	[寛解導入]CPX-351 高リスクAML	ピキセオス配合静注用	100ユニット/m ²	点滴静注 day 1, 3, 5	14日	高リスク急性骨髄性白血病	済	
		[再寛解導入]CPX-351 高リスクAML	ピキセオス配合静注用	100ユニット/m ²	点滴静注 day 1, 3				35日
		[地固め]CPX-351 高リスクAML	ピキセオス配合静注用	65ユニット/m ²	点滴静注 day 1, 3				35日
2024.9.9	24678	[1コース目]IsaPd療法 多発性骨髄腫 (固定輸注量法)	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 再発又は難治性	済	
			ボマリストカプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21				
			デキサート注射液	20-40 mg/body	点滴静注 day 1, 8, 15, 22				
		[2コース目以降]IsaPd療法 多発性骨髄腫 (固定輸注量法)	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日			
			ボマリストカプセル	1-4 mg/body	経口投与 day 1-21				
			デカドロン錠	20-40 mg/body	経口投与 day 8, 22				
2024.9.9	24679	[1コース目]IsaKd療法 多発性骨髄腫 (固定輸注量法)	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 8, 15, 22	28日	多発性骨髄腫 再発又は難治性	済	
			カイプロリス点滴静注用	20 mg/m ² 56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2 点滴静注 day 8, 9, 15, 16				
			デキサート注射液	20 mg/body	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22				
			レナデックス錠	20 mg/body	経口投与 day 23				
		[2コース目以降]IsaKd療法 多発性骨髄腫 (固定輸注量法)	サークリサ点滴静注用	10 mg/kg	点滴静注 day 1, 15	28日			
			カイプロリス点滴静注用	56 mg/m ²	点滴静注 day 1, 2, 8, 9, 15, 16				
2025.2.4	24694	[リンパ球除去化学療法(Ide-cel)] CPA(300)+FLU(30) MM	注射用エンドキサン	300 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	5日	再発又は難治性の多発性骨髄腫 (アベクマ点滴静注投与の前処置)	済	
			フルダラ静注用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1-3				
	24695	[リンパ球除去化学療法(Liso-cel)] CPA(300)+FLU(30) LBCL	注射用エンドキサン	300 mg/m ²	点滴静注 day 1-3	4日			再発又は難治性の多発性骨髄腫 (プレマジン点滴静注投与の前処置)
			フルダラ静注用	30 mg/m ²	点滴静注 day 1-3				